

## 14. LE LEZARD MONTAGNARD PYRENEEN

*Lacerta monticola* Boulenger, 1905  
(= *Archeolacerta monticola*)  
[umusker gzukskãdera] (Pays  
Basque).

### Description

Corps robuste et aplati. Queue environ deux fois plus longue que tête et tronc réunis, épaisse à sa base. Doigts fins armés de griffes. Se caractérise par une rostrale en contact avec l'internasale, mais pas avec la narine. Supranasale touchant la loréale (postnasale). Rostrale en large contact avec l'internasale chez *bonnali*. Généralement 5<sup>e</sup> supralabiale en contact avec l'œil. Première supratemporale petite et rectangulaire. Ecailles dorsales lisses. Ventrals subrectangulaires. De 11 à 17 pores fémoraux à chaque cuisse. Coloration variable selon les populations. Dos habituellement ocre-brun, noisette, brun-vert, uni ou moucheté, parfois avec des reflets métallisés, orné quelquefois d'une ligne sagittale sombre plus ou moins floue. Flancs sombres. Parfois petites taches pariétales foncées, raies supra-oculaires et supraciliaires. Tache temporale allongée et étroite, brunâtre, se prolongeant souvent avant l'œil jusqu'à la narine et le long du flanc et de la queue. Parties ventrales jaune verdâtre, vert, vert bleuté, non tachetées (ssp. *bonnali*). Pas d'ocelles bleues sur les ventrales externes, mais quelquefois macules noirâtres réparties surtout vers l'anale. Chez le juvénile, le ventre est blanc vert et la queue canard. Longueur totale de l'adulte de 150 à 200 mm (exceptionnellement 250 mm).

### Dimorphisme sexuel

Mâles : dos parfois vert (surtout ligne sagittale) ; ventre tirant sur le bleu à l'époque de la reproduction. Plus petits.

### Milieu

Habite en altitude des biotopes variés, mais souvent humides (3) : éboulis, pen-

tes rocheuses plantées de pins, lisières des bois, broussailles avec genévriers ou bruyères, lits de ruisseaux composés de galets. Présence quasi exclusive au-dessus de 1 100 m, dans des zones à climat rude.

### Alimentation

Régime composé surtout de Coléoptères, Arachnidés, Orthopères, larves de Diptères, Formicidés.

### Reproduction

Ponte vers fin juillet (Müller & Hellmich).

### Répartition

Espèce montagnarde pyrénéenne, ainsi que du centre et du nord-ouest de la péninsule Ibérique, jusqu'au milieu du Portugal. Des 4 sous-espèces connues, seule *bonnali* Lantz, 1927, est présente en France. Son aire s'étend de l'est des Pyrénées-Atlantiques à travers les Hautes-Pyrénées jusqu'à la Haute-Garonne. Son existence dans ce dernier département et dans l'Ariège est probable, bien que non encore confirmée.

Femelle observée en juin 1979. ►



14. Léopard montagnard pyrénéen,  
*Lacerta monticola bonnali*.

