

COMPANHIA DE DIAMANTES DE ANGOLA
(DIAMANG)
SERVIÇOS CULTURAIS
DUNDO—LUNDA—ANGOLA

MUSEU DO DUNDO



SUBSÍDIOS PARA O ESTUDO DA BIOLOGIA
NA LUNDA



*«Reptiles et Batraciens de la région de Dundo
(Angola du Nord-Est)»*

(Première note)

PAR

R. LAURENT

Associé du

Fonds National de la Recherche Scientifique

de

BELGIQUE



LISBOA

1 9 5 0

REPTILES et BATRACIENS de la région de Dundo (Angola du Nord-Est)

(Première note)

Les collections dont l'inventaire figure ci-après ont été constituées par le DR. A. de BARROS MACHADO dans les environs immédiats de Dundo, et par M. de PETCHKOVSKY, prospecteur de la «Companhia de Diamantes de Angola», à 100 km. au sud-est de Dundo, sur la rive droite de la Luembe près de son confluent avec la Muita.

OPHIDIENS

1. *Typhlops punctatus punctatus* (Leach)

2 spécimens de Dundo (1946-1947). 1 spécimen de Muita (VII-1948).
Nom vernaculaire: Tshiniaueji.

2. *Typhlops boulengeri* Bocage

1 spécimen récolté près de la rivière Muari (affluent de la Luachimo), dans les environs de Dundo.

Nom vernaculaire: comme le précédent.

3. *Typhlops schlegeli mucroso* (Peters)

3 spécimens de Dundo (IV-V-1948). 4 spécimens de Muita (IV-V-1948).
Nom vernaculaire: comme les précédents.

4. *Neusterophis olivaceus olivaceus* (Peters)

2 ♀, Muita, Luembe E (V-1948 et VIII-1948).
Ventrals: 140, 134. Sous-caudales: 52, 24 + ? (queue mutilée).

5. *Boaedon lineatus lineatus* Duméril & Bibron

1 ♀, Dundo (XI-1946); 1 ♂, Dundo (30-X-1947); 1 ♀, Dundo (4-XII-1947); 1 ♀, Dundo (20-XII-1947); 1 ♂, Dundo (V-1948); 1 ♂ (sans indications).

Ventrals: 198, 195, 193 (♂♂); 208, 216, 223 (♀♀). Sous-caudales: 64, 66, 56 (♂♂); 49, 52, 49 (♀♀).

Nom vernaculaire: Tshissona — Kanga (?).

6. *Bothrophthalmus lineatus lineatus* (Peters)

1 ♀, environs de Dundo (1946); 1 ♀, Dundo (VI-1948).
Ventrales: 195, 193. Sous-caudales: 76, 72.
Nom vernaculaire: Kongôlu.

7. *Mehelya poensis* (A. Smith)

1 ♀, Muita, Luembe E (V-1948).
Ventrales: 246. Sous-caudales: 93.

8. *Chlorophis irregularis* (Leach)

2 ♀, Dundo (1946); 1 ♀, Dundo (28-X-1947); 1 ♀, Dundo (XI-1946); 1 juv.,
Dundo (VI-1948).
Ventrales: 159, 164, 155, 152, 159, 156. Sous-caudales: 87, 90, 90, 93, 90, 52
(queue mutilée). Un exemplaire avait dans l'estomac un *Hyperolius marmoratus angolensis*.
Nom vernaculaire: Kalembe-Lembwe.

9. *Chlorophis heterolepidotus* (Günther)

1 juv., Dundo (1947); 1 ♀, Muita, Luembe E (VII-1948).
Ventrales: 181, 187. Sous-caudales: 66 (queue mutilée), 114.
Nom vernaculaire: comme le précédent.

10. *Philothamnus semivariiegatus semivariiegatus*. A. Smith

1 ♀, Dundo (1946); 1 ♀, Dundo (VII-1947); 1 ♀, Dundo (I-1948); 1 ♂, 2 ♀, Dundo
(III-1948); 1 ♂, Dundo (V-1948).
Ventrales: 169, 173 (♂♂); 188, 191, 197, 191, 192 (♀♀).
Sous-caudales: 111, 112 (♂♂); 128, 129, 123, 122, 129 (♀♀).
Un de ces spécimens a été trouvé sur un manguier.

11. *Rhamnophis aethiopissa ituriensis* Schmidt

1 ♂, sur un arbuste dans la forêt des sources de la Mussungue (affluent de la Luachimo),
près de Dundo (6-X-1946).
Ventrales: 164. Sous-caudales: 130.

12. *Grayia smythii* (Leach)

1 ♀, Dundo, rivière Luachimo (VII-1948).
Ventrales: 162. Sous-caudales: 30. A été trouvé dans l'eau.
Nom vernaculaire: Fuji wa meia.

13. *Grayia ornata* (Bocage)

1 ♀, galerie forestière de la Luachimo, près de Dundo (7-XI-1947); 1 juv., dans un affluent de la rive droite de la Tshihumbwe, à environ 50 km à l'ouest de Dundo (III-1948); 1 ♂, Dundo (VI-1948).

Ventrales: 151 (♀), 149 (♂), 146 (juv.). Sous-caudales: 70 (♀), 31 (♂, queue mutilée), 69 (juv.).

Les parties claires étaient de couleur orange chez le juvénile en vie.

Nom vernaculaire: Tshihiri Munene.

14. *Scaphiophis albopunctatus* Peters

1 ♂, Muita, Luembe E (V-1948).

Ventrales: 176. Sous-caudales: 65.

Non vernaculaire: Tshissona-Kanga (?).

15. *Prosymna ambigua ambigua* Bocage

1 ♀, Dundo (16-XII-1947); 1 ♀, Dundo (VI-1948).

Ventrales: 145, 141. Sous-caudales: 16, 17.

16. *Boiga blandingii* (Hallowell)

1 tête, Dundo (15-XII-1947).

17. *Crotaphopeltis hotamboeia hotamboeia* (Laurenti)

1 ♀, Dundo (4-XII-1947); 1 ♀, Dundo (III-1948).

Ventrales: 159, 157. Sous-caudales: 33, 37.

Nom vernaculaire: Lunoka wa lubwebwe.

Le premier exemplaire avait, vivant, la région temporale bleu foncé; son estomac contenait une grenouille; il portait aussi deux *Porocephalus*, l'un près de la tête, l'autre vers le milieu du corps.

18. *Psammophis sibilans sibilans* (Linné)

1 ♀, Dundo (XI-1946); 1 ♀, Dundo (XI-1947); 1 ♀, Dundo, sous les herbes, dans un verger (10-I-1948); 3 ♀, Dundo (VI-1948).

Ventrales: 177, 172, 171, 172, 176, 174. Sous-caudales: 97, 96, 98, 70 + ? (queue mutilée), 49 + ? (queue mutilée), 97.

Nom vernaculaire: Trembe.

19. *Psammophis angolensis* Bocage

1 ♀, Dundo (VI-1948).

Ventrales: 144. Sous-caudales: 64.

20. *Dispholidus typus* (A. Smith)

1 ♂, Dundo (1946); 1 ♂, Dundo (30-X-1947); 1 ♂, Dundo (3-XI-1947); 1 ♂, Dundo (12-XII-1947); 2 ♂, Dundo (III-1948); 1 ♂, Dundo (V-1948); 1 ♂, 3 ♀, Dundo (VI-1948); 1 ♂, Dundo (VII-1948).

Ventrales: 168, 174, 176, 170, 176, 178, 181, 176, 174 (♂♂); 177, 176, 176, (♀♀).

Sous-caudales: 106, 103, 101, 104, 104, 103, 114, 102, 105 (♂♂); 106, 108, 107 (♀♀).

Nom vernaculaire: Tshilenga-Muri.

L'un de ces spécimens avait un caméléon dans l'estomac.

21. *Hypoptophis wilsoni katangae* (L. Müller)

1 ♀, Dundo (IV-1948).

Ventrales: 109. Sous-caudales: 33.

Nom vernaculaire: Fuji Muke.

Cette forme n'est jusqu'ici connue que par un petit nombre d'exemplaires.

22. *Naja melanoleuca* Hallowell

1 ♀, Dundo (V-1948).

Ventrales: 217. Sous-caudales: 66.

23. *Naja nigricollis nigricollis* Reinhardt

1 ♂, Dundo (VI-1948).

Ventrales: 186. Sous-caudales: 57.

Nom vernaculaire: Tshissona-Kanga (?) [1].

24. *Pseudohaje goldii* (Boulenger)

1 ♂, Dundo (X-1946); 1 ♀, environs de Dundo (IV-1947).

Ventrales: 198 (♂), 193 (♀). Sous-caudales: 88 (♂), 86 (♀).

Nom vernaculaire: Tshissapa.

25. *Dendroaspis jamesoni jamesoni* (Trail)

1 ♂, Dundo (17-IV-1948).

Ventrales: 218. Sous-caudales: 97.

Ce spécimen a été tué dans le village indigène où il se nourrissait de poussins. Le récolteur fournit les notes de coloration suivantes: «sur le ventre, vert clair, plus jaunâtre vers la partie antérieure; flancs d'un vert pur; tête olivâtre sur le dessus; noirâtre vers l'avant, puis vert jaunâtre, puis vers chlorophylle sur le tiers postérieur; queue plus jaune».

(1) La dénomination vernaculaire Tshissona-Kanga serait appliquée à trois serpents différents (un *Naja*, un *Boaedon* et un *Scaphiophis*). Ceci paraît peu vraisemblable, car il s'agit de formes bien distinctes.

26. *Causus rhombeatus* (Lichtenstein)

Spécimens de Dundo: 1 ♂ (27-IX-1947); 1 ♀ (11-X-1947); 1 ♀ (25-X-1947); 2 ♀ (XI-1947); 1 ♀ (XII-1947); 1 ♂, 2 ♀ (I-1948); 4 ♂, 1 ♀, 3 juv. (III-1948); 1 ♂ (IV-1948).

Spécimens de Muita, Luembe E: 1 ♀ (IV-1948); 1 ♂, 2 juv. (V-1948); 3 ♂ (VII-1948); 1 ♂, 1 ♀ (VIII-1948).

Ventrales: ♂♂ : Dundo: 147, 138, 142, 143, 144, 140, 138. Muita: 142, 141, 144, 144, 141. ♀♀: Dundo: 143, 146, 145, 134, 148, 145, 143, 147. Muita: 145, 144. Juvéniles. Dundo: 138, 145, 142. Muita: 143, 142.

Sous-caudales. ♂♂ : Dundo: 27, 24, 34, 29, 31, 22, 25. Muita: 32, 29, 29, 28, 27. ♀♀: Dundo: 19, 18, 21, 21, 30, 26, 20, 27; Muita: 20, 27. Juvéniles: Dundo: 24, 20, 25; Muita: 24, 18.

Si on considère isolément, les nombres de ventrales et de sous-caudales, le dimorphisme sexuel y apparaît relativement peu important: les mâles ont de 138 à 147 ventrales ($m=142,5$) et de 22 à 34 sous-caudales ($m=28,1$); les femelles ont de 134 à 148 ventrales ($m=144$) et de 18 à 27 sous-caudales ($m=22,9$); mais les zones de superposition s'amenuisent fortement si on considère la corrélation des deux variables, car les nombres élevés de ventrales correspondent aux nombres élevés de sous-caudales chez les deux sexes.

Un spécimen avait un crapaud dans l'estomac.

Nom vernaculaire: Tshihiri.

27. *Causus lichtensteini* (Jan)

1 juv. rivière Lukashi (affluent de la rive gauche de la Tshihumbwe).

Ventrales: 136. Sous-caudales: 14.

28. *Bitis lachesis* (Laurenti)

1 ♀, Dundo (V-1948); 1 ♀, Muita, Luembe E (V-1948); 1 ♂, 2 ♀, Muita, Luembe E (VII-1948).

Ventrales: 137 (♀), 135 (♀), 129, (♂), 134 (♀), 140 (♀).

Sous-caudales: 19 (♀), 18 (♀), 34 (♂), 23 (♀), 19 (♀).

Nom vernaculaire: Tshihiri Munene.

29. *Bitis gabonica* Duméril & Bibron

1 tête, Dundo (IV-1948).

Nom vernaculaire: Ienge.

30. *Atractaspis bibroni rostrata* Günther

1 ♂, Dundo (1946).

Ventrales: 237 (2 + 0). Sous-caudales: 24.

Cette forme est un élément caractéristique de la faune katangaise, dont le domaine s'étend donc assez loin vers l'ouest.

LACERTILIENS

1. *Hemidactylus mabouia* (Jonnès)

3 spécimens, Dundo (21-IX-1946).

2. *Varanus niloticus niloticus* (Linné)

1 spécimen juvénile, Muita, Luembe E (V-1948).

Nom vernaculaire: Mussenvu.

3. *Agama atricollis* A. Smith

1 spécimen, Dundo (XI-1946); 1 juv., Dundo (1-1948).

Nom vernaculaire: Tshikwa-Tshamukala.

4. *Chamaeleo dilepis dilepis* Leach

2 spécimens, Dundo (29-IX-1946); 2 spécimens, Dundo (VI-1948); 1 spécimen, Muita, Luembe E (VII-1948).

Nom vernaculaire: Nongwena.

5. *Ichnotropis capensis overlaeti* Witte & Laurent

1 spécimen, Dundo (18-IX-1946); 3 spécimens, Dundo (14-XII-1947); 1 juv., Dundo (18-XII-1947); 1 spécimen, Muita, Luembe E (VII-1948).

Noms vernaculaires: Kassulu, Tshitombwe Muke.

Chez les mâles vivants, il existe une ligne latérale rouge vif.

6. *Gerrhosaurus nigrolineatus nigrolineatus* Hallowell

1 spécimen, Dundo (1-XI-1947); 1 ♂, 1 ♀, Dundo (XII-1947).

Nom vernaculaire: Tshitombwe.

7. *Mabuya maculilabris* (Gray)

1 spécimen, Dundo (X-1946); 1 spécimen, Dundo (XI-1946); 1 spécimen, Dundo (V-1947); 1 spécimen, Muita, Luembe E (V-1948); 1 spécimen Muita, Luembe E (VII-1948).

Nom vernaculaire: Kassulu.

CHELONIENS

1. *Pelusios subniger* (Lacépède)

1 spécimen, rivière Tshihumbwe (XII-1947).

2. *Kinixys belliana* (Gray)

1 spécimen, Muita, Luembe E (III-1948).

Nom vernaculaire: Kakafulu.

BATRACIENS

1. *Xenopus* sp.

1 spécimen en mauvais état, provenant de la mine de Mussolechi, près de Luaco, trouvé dans un ruisseau à eau assez chaude exposée au soleil. L'espèce n'est pas déterminable.

2. *Xenopus tropicalis* (Gray)

4 spécimens, environs de Dundo, galerie forestière de la Luachimo, dans une mare temporaire (début de VI-1948).

3. *Xenopus fraseri* Boulenger

1 spécimen, Muita, Luembe E (IV-1948); 5 spécimens, récoltés en même temps que les *X. tropicalis*.

4. *Bufo regularis regularis* Reuss

1 spécimen, Dundo (X-1946) 1 spécimen, Dundo (II-1948); 2 spécimens, Muita, sur la rive droite de la Luembe, dans un puits de prospection asséché (I-1948); 3 spécimens, Muita, Luembe E (III-1948); 18 spécimens, Muita, Luembe E (V-1948).

5. *Bufo funereus* Bocage

1 spécimen, Dundo (X-1946); 1 spécimen, Muita, Luembe E (III-1948); 3 spécimens, Muita, Luembe E (V-1948).

6. *Bufo lemairei* Boulenger

2 spécimens, Muita, Luembe E (III-1948); 3 spécimens, Muita, Luembe E (IV-1948); 7 spécimens, Muita, Luembe E (V-1948).

Vivant, un de ces individus était de couleur jaune.

Cette espèce est un élément caractéristique de la faune katangaise.

7. *Dicroglossus occipitalis* (Günther)

2 spécimens, Muita, Luembe E, dans la vallée marécageuse de la Kasseke (affluent de la Muita) (III-1948); 1 spécimen, Muita, Luembe E (III-IV-1948); 2 spécimens, Muita, Luembe E (IV-1948); 10 spécimens, Muita, Luembe E (V-1948).

Il existe de bonnes raisons anatomiques (Corrélation de l'arcizonie et de l'omosternum fourchu chez *Dicroglossus*, de la firmisternie parfaite et l'omosternum non fourchu chez *Rana*) et zoogéographiques de restreindre l'application de la dénomination générique *Rana* aux espèces holarctiques et aux formes éthiopiennes du groupe *fuscigula-darlingi*.

8. *Rana fuscigula angolensis* Bocage

1 spécimen, Dundo (X-1946); 1 spécimen, Dundo (II-1948); 2 spécimens, rive de la Tshihumbwe, 40 km à l'est de Dundo (4-I-1948); 1 spécimen, Tshinguvu, galerie forestière de la Tshikapa, 50 km au sud-ouest de Dundo (I-1948).

9. *Ptychadena oxyrhynchus oxyrhynchus* (A. Smith)

1 spécimen, Dundo (II-1948); 7 spécimens, Muita, Luembe E (III-1948); 1 spécimen, id., (III-IV-1948); 30 spécimens, id. (IV-1948); 30 spécimens, id. (V-1948); 5 spécimens, id. (VII-1948); 7 spécimens, id. (VIII-1948).

L'exemplaire de Dundo a été capturé dans une fenêtre du laboratoire.

10. *Ptychadena bibroni* (Hallowell)

1 spécimen, Muita, Luembe E (III-1948); 1 spécimen, id. (III-IV-1948); 13 spécimens, id. (IV-1948); 8 spécimens, id. (V-1948).

11. *Ptychadena ansorgei* (Boulenger)

5 spécimens, Muita, Luembe E (III-1948); 2 spécimens, id. (III-IV-1948); 16 spécimens, id., (IV-1948); 11 spécimens, id. (V-1948); 1 spécimen, id. (VII-1948).

12. *Hylarana albolabris albolabris* (Hallowell)

1 spécimen, rive de la Tshihumbwe, 40 km à l'est de Dundo (4-I-1948); 2 spécimens, Tshinguvu, galerie forestière de la Tshikapa, 50 km au sub-ouest de Dundo (I-1948); 1 spécimen, Dundo (II-1948); 5 spécimens, Muita, Luembe E (III-1948); 3 spécimens, id. (III-IV-1948); 27 spécimens, id. (IV-1948); 25 spécimens, id. (V-1948); 2 spécimens (VII-1948).

13. *Phrynobatrachus natalensis* A. Smith

3 spécimens, Dundo, rive herbeuse de la Luachimo (X-1947); 2 spécimens, Dundo (II-1948); 1 spécimen, Muita, Luembe E dans un puits de prospection assêché (I-1948); 1 spécimen, Muita, Luembe E (III-1948); 15 spécimens, id. (IV-1948); 25 spécimens, id. (V-1948); 7 spécimens, id. (VIII-1948).

14. *Phrynobatrachus minutus* (Boulenger)

6 spécimens, Marrura, rive droite de la Tshikapa, 50 km au sud-ouest de Dundo, dans la forêt-galerie, au bord de l'eau, dans les détritux végétaux accumulés par le courant de la rivière (17-VI-1948); 1 spécimen, galerie forestière de la Luachimo, environs de Dundo (VII-1948).

15. *Hemisus marmoratum guineense* Cope

13 spécimens, Muita, Luembe E (IV-1948); 10 spécimens, id. (V-1948); 1 spécimen, id. (VII-1948); 1 spécimen, id. (VIII-1948).

16. *Arthroleptis boulengeri* Witte

4 spécimens, Dundo, galerie forestière de la Luachimo, au bord de l'eau, dans les detritux végétaux (VII-1948).

Cette forme est typiquement katangaise.

17. *Arthroleptis xenochirus* Boulenger

4 spécimens, environs de Dundo (XI-1946).

18. *Leptopelis tessmanni* (Nieden)

1 spécimen, rive de la Tshihumbwe, 40 km à l'est de Dundo (6-I-1948).

A. DE BARROS MACHADO a noté les changements de couleur de cet individu. En quelques minutes, la coloration originale (dans l'obscurité) qui était d'un vert chlorophylle uniforme passait au brun, au jaune verdâtre, puis au vert foncé et enfin au vert très sombre; la coloration ventrale est restée d'un jaunâtre clair.

19. *Leptopelis bocagei* (Günther)

7 spécimens, Muita, Luembe E (IV-1948); 3 spécimens, id. (V-1948); 1 spécimen, id. (VII-1948).

20. *Hyperolius angolanus* Ahl

1 spécimen, sur un arbuste dans la galerie forestière de la Luachimo, environs de Dundo (30-IX-1946).

Le statut de cette forme est très incertain; elle est probablement en relations raciales avec des formes plus septentrionales comme *H. platyceps* ou *H. langi*.

21. *Hyperolius cinnamomeoventris* Bocage

1 ♀, Matala, rive gauche de la Tshihumbwe, à 40 km à l'est de Dundo (I-1948); 1 ♀, Muita, Luembe E (IV-1948); 1 ♀, id. (V-1948).

22. *Hyperolius kivuensis kivuensis* Ahl

2 spécimens, Matala, rive gauche de la Tshihumbwe, 40 km à l'est de Dundo (I-1948); 2 spécimens, Muita, Luembe E (III-1948); 2 spécimens, Kossa, dans les herbes d'une plaine marécageuse au bord de la Luembe (VI-1948).

La coexistence de *H. kivuensis* et *H. cinnamomeoventris* montre bien que l'isolement biologique est chose acquise, du moins en ce qui concerne ces populations locales. *H. kivuensis* est encore un élément faunistique oriental.

23. *Hyperolius quinquevittatus* Bocage

1 spécimen, Dundo (V-1948).

24. *Hyperolius bocagei* Steindachner

4 spécimens, Dundo, sur les plantes des jardins (VI-1948); 2 spécimens, id. (20-VIII-1948); 8 spécimens, Muita, Luembe E (IV-1948); 24 spécimens, id. (V-1948); 4 spécimens, id. (VII-1948).

Le dimorphisme sexuel est moins net chez cette espèce que chez la majorité des autres: le sac vocal est peu développé, et peut être aisément confondu avec le repli gulaire existant en général chez les femelles. La coloration est relativement bien conservée: rose avec une traînée carminée sur le canthus et derrière l'œil, cuisses jaunes avec une aire rouge vermillon peu étendue dans sa région distale, face inférieure jaunâtre, partie distale des doigts et des orteils rouge vif.

25. *Hyperolius steindachneri steindachneri* Bocage

2 ♀, provenant de Dundo. Les colorations étaient encore relativement bien conservées: le dos est jaune vert chez l'un des spécimens, beige chez l'autre; les cuisses et les parties inférieures des membres postérieurs sont rougeâtres, coloration superposée à la pigmentation crurale caractéristique de l'espèce (noire avec taches blanches).

26. *Hyperolius marmoratus angolensis* Steindachner

1 spécimen, environs de Dundo, dans la savane, exposé au soleil sur une feuille verte de *Vitex Cienkowskii* (4-X-1946); 1 spécimen, Dundo, dans l'estomac d'un *Chlorophis* (X-1946); 1 spécimen, Dundo, dans l'estomac de *Chlorophis irregularis* (XI-1946); 2 spécimens, Dundo, sur les plantes des jardins (VI-1948); 5 spécimens, id. (20-VIII-1948); 1 spécimen, Dundo (V-1948); 2 spécimens, Dundo (17-VIII-1948); 1 spécimen, Matala, rive gauche de la Tshihumbwe, 40 km à l'est de Dundo (I-1948); 8 spécimens, Muita, Luembe E (III-1948); 6 spécimens, id. (IV-1948); 10 spécimens, id. (V-1948); 4 spécimens, id. (VII-1948).

La plupart des mâles ont conservé la livrée juvénile. Chez de nombreux spécimens, les pigments semblent avoir été bien fixés: la livrée adulte est d'un brun rouge plus ou moins sombre sur le dos, avec la face inférieure des membres et les cuisses rouge vermillon, le ventre jaunâtre marbré de rouge (cette couleur pouvant dominer), les flancs bleuâtres, la gorge blanchâtre plus ou moins marbrée de brun. Chez les jeunes et les mâles qui ont gardé la livrée juvénile, les couleurs rouges ventrales sont atténuées, faibles sous les membres antérieurs, presque inexistantes sur le ventre.

27. *Hyperolius nasutus nasutus* Günther

1 spécimen, Muita, Luembe E (IV-1948); 1 spécimen, rive de la Tshihumbwe, 40 km à l'est de Dundo, dans les herbes (26-I-1948); 4 spécimens, Kossa, à 100 km au sud-est de Dundo, dans les herbes d'une plaine marécageuse, au bord de la Luembe (VI-1948); 1 spécimen, environs de Dundo, rives de la Luachimo (14-VIII-1948). Ce dernier individu a été capturé au fauchoir, dans les herbes.

28. *Hyperolius oxyrhynchus* (Boulenger)

1 spécimen, Muita, Luembe E (IV-1948).
Cette espèce est typiquement katangaise.

(A SUIVRE)