

Die Herpetofauna Sachsens

HEINZ BERGER, NABU Landesverband Sachsen, Löbauer Str. 68, D-04347 Leipzig

Ausgehend von der historischen Entwicklung der Herpetologie in Sachsen werden der heutige Kenntnisstand zur Verbreitung der Herpetofauna sowie deren Vorkommen in den verschiedenen Landschaftsräumen und Höhenstufen Sachsens dargelegt. Ausführungen zur gegenwärtigen Situation, vor allem zur Gefährdung und zu bisherigen Schutzbemühungen runden den Beitrag ab.

Insgesamt sind folgende Arten im Freistaat Sachsen heimisch: *Salamandra salamandra*, *Triturus alpestris*, *T. vulgaris*, *T. cristatus*, *T. helveticus*, *Bufo bufo*, *B. viridis*, *B. calamita*, *Pelobates fuscus*, *Hyla arborea*, *Bombina bombina*, *B. variegata* (erloschen), *Rana temporaria*, *R. arvalis*, *R. dalmatina*, *R. ridibunda*, *R. lessonae*, *R. kl. esculenta*, *Emys orbicularis* (erloschen), *Lacerta agilis*, *L. vivipara*, *Anguis fragilis*, *Natrix natrix*, *N. tessellata* (wieder eingebürgert), *Coronella austriaca*, *Vipera berus*. Allochthon (angesiedelt): *Bombina variegata*, *Podarcis muralis*.