

LEZARD TYRRHENIEN

Podarcis tiliguerta Gmelin



Podarcis tiliguerta, mâle, Vizzavona, Parc naturel régional de Corse.

J.L. Bodinier

RÉPARTITION.

Le Lézard tyrrhénien, très proche du Lézard des murailles, est localisé à la Corse.

TAILLE.

18 à 24 cm, mâle plus grand.

COLORATION.

La face dorsale est souvent brunâtre chez la femelle et verdâtre chez le mâle avec des taches foncées réticulées plus ou moins importantes. Le dessin est très variable. La tête est brune ou jaune or avec ou sans tache bleu noir. La face ventrale est blanchâtre, jaune, rose ou même rouge. Des points sombres sont présents, au moins sous la gorge.

BIOTOPE.

Il préfère les endroits secs où il fréquente les broussailles, les bois clairs, les murs de pierres sèches, les bordures de champs et de routes. On le trouve jusqu'à plus de 1800 m d'altitude.

COMPORTEMENT.

Comme le Lézard des murailles, il est diurne, agile et rapide.

HIVERNAGE.

Du début de l'automne à la fin de février ou mars.

NOURRITURE.

Invertébrés divers.

REPRODUCTION.

L'accouplement a lieu d'avril à mai. La femelle pond 6 à 12 œufs de 10 à 16 mm de long. L'incubation qui dépend de la température ambiante dure 2 à 3 mois. A la naissance, les jeunes mesurent 5 à 6 cm.



Femelle de Vizzavona, Parc naturel régional de Corse. J.L. Bodinier