

Lagarto verde

Lacerta (Lacerta) bilineata
(Daudin, 1802)



Unidad operativa de conservación

En un principio se venía considerando la existencia en Europa de una sola especie de Lagarto verde, si bien se distinguían dos subespecies, *L. viridis bilineata* para las poblaciones occidentales y *L. v. viridis* para las orientales.

Actualmente, y tras varios estudios genéticos y de hibridación, estas subespecies han pasado a adquirir rango de especies, quedando reconocida la población occidental como *L. bilineata* (Barbadillo *et al.*, 1999). Se toma como unidad operativa de conservación la población ibérica de esta especie.

Protección legal

Autonómica

CREA actual: «de interés especial-riesgo relativo»

Estatal

CNEA: «de interés especial»

UE

Directiva Hábitats: Anexo IV

Convenios internacionales

Convenio de Berna: Anexo II

Categorías UICN

Autonómica

LC

Estatal

LC (2002)

Mundial

LC

Justificación de los criterios

Es una especie común en medios con vegetación herbácea y arbustiva abundante en la mayor parte de su área de distribución dentro de la Península Ibérica y de Asturias. Además es una especie que no parece tener una problemática de conservación especial.

Situación y tendencia de la población

Es relativamente común e incluso abundante en alguna localidad. Únicamente en los bordes o en áreas aisladas de su distribución se encuentran pocos individuos (Barbadillo, 2002).

Distribución

En Asturias se encuentra únicamente en la zona oriental.

En España se distribuye por el tercio norte sin alcanzar Galicia (Barbadillo, 2002). Su límite meridional se encuentra en el norte del Sistema Ibérico, incluido el Moncayo. Su límite occidental está en la mitad oriental de Asturias y León (Barbadillo, 2002). En Cataluña parece tener condicionada su distribución a áreas con una precipitación anual superior a los 800 mm y temperatura media anual inferior a los 14°C (Barbadillo, 2002).

En Europa ocupa el norte de España, Francia, oeste de Alemania, y norte y centro de Italia, alcanzando hacia el este Eslovenia y el extremo noroccidental de Croacia, en la costa adriática (Barbadillo, 2002).

En el mundo ocupa el norte de España, Francia, oeste de Alemania, y norte y centro de Italia, alcanzando hacia el este

Eslovenia y el extremo noroccidental de Croacia, en la costa adriática (Barbadillo, 2002).

Hábitat


Ocupa una gran variedad de hábitats, aunque prefiere zonas con abundante cobertura vegetal herbácea o arbustiva (prados, zonas de matorral, linderos o zonas aclaradas de bosques). Está presente también en sotos y márgenes de ríos (Barbadillo *et al*, 1999). Se encuentra desde el nivel del mar hasta cerca de los 2 200 m en el Sistema Ibérico.

Amenazas

- **Incendios** y quemas de matorral, brezales, tojales y sotos.

Mapas de distribución

Asturias



- Algunas **prácticas ganaderas**.
- Contaminación por **pesticidas**.
- La **agricultura intensiva**.

Medidas de conservación

Propuestas:

- La conservación de setos, linderos y de vegetación ribereña.
- Uso racional de pesticidas.

España

