

Nome scientifico *Podarcis sicula* (Rafinesque, 1810)

Sinonimi:

Nome comune Lucertola campestre



Livello di protezione

La specie è inserita nell'allegato IV della Direttiva comunitaria 92/43 "Habitat". A livello regionale, è protetta dalla L.R. 4/92.

Identificazione

La lucertola campestre è un sauro di medie dimensioni (lunghezza massima 20 cm). In Liguria, è presente la sottospecie *P. sicula campestris* che presenta ventre senza macchie (sempre macchiato di scuro almeno sulla gola in

P. muralis) e dorso con due strie vertebrali verde brillante. L'eventuale confusione con giovani ramarri (*L. bilineata*) viene evitata osservando le squame ventrali: tutte le file verticali sono simili in *P. sicula campestris*, mentre quelle centrali sono più strette delle altre in *L. bilineata*.

Distribuzione

Diffusa in tutta Italia, isole maggiori comprese, la Lucertola campestre raggiunge il limite settentrionale in Piemonte e in Friuli. In Liguria è presente solo nella piana del Magra dove è localmente piuttosto comune. In questa parte dell'areale non supera i 300 m.

Notizie utili per la conservazione della specie


Vive nelle zone prative, nelle radure, lungo gli argini e le rive del Magra e dei suoi affluenti. Piuttosto adattabile alle aree agricole e a quelle ad urbanizzazione sparsa. L'attività si estende da febbraio a novembre.

Possibili minacce e fattori di rischio

Le popolazioni della Valle del Magra non sembrano esposte a particolari rischi.

Interventi gestionali

Buona parte delle popolazioni liguri ricade all'interno di pSIC. Il mantenimento degli argini, delle zone prative naturali e di aree ecotonali aperte lungo il corso del Magra sembra sufficiente a tutelare queste popolazioni.



Interventi utili per migliorare lo status delle popolazioni locali

La specie non sembra necessitare di particolari attività gestionali mirate.

Metodi di monitoraggio

La specie è facilmente avvistabile di giorno quando è in attività. La

cattura e la marcatura temporanea (tramite coloranti atossici) sono piuttosto semplici. Le operazioni di cattura, marcatura e la stima della popolazione possono essere condotta solo da un competente specialista dotato di autorizzazione ministeriale (art. 12, DPR 357/97).

Bibliografia

CAPUTO V. (1994). Lucertola campestre – *Podarcis campestris*. In Atlante degli Anfibi e Rettili della Liguria. DORIA G. & SALVIDIO S. (Eds). Cataloghi dei beni naturali, 2. Regione Liguria.

WHITE, G.C., ANDERSON, D.R., BURNHAM, K.P. & OTIS, D.L. (1982). *Capture-recapture removal methods for sampling closed populations*. Los Alamos National Laboratory 8787 NERP, Los Alamos, New Mexico.

Autore Sebastiano Salvidio