ACTES

DE

LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE BORDEAUX.

N.° 42. -- 15 JANVIER 1843.

ZOOLOGIE.

XII. Catalogue *d'une partie des animaux vivants dans le département de la Charente.*

Doué par la nature, instruit à son école,
Chacun marche ou gravit, court, saute, rampe ou vole.
(Delille, *Les Trois Règnes*, Chant VII).

L'auteur de ce Mémoire a suivi, pour les Mammifères, la classification de Cuvier, en y joignant les noms donnés par Linné, quelques auteurs, et Buffon, et a cité les planches des œuvres de ce dernier, édition in-4°, de 1775. Il a adopté, pour les Oiseaux, la méthode de Vieillot, comme la plus naturelle, et a rapporté aussi les noms donnés par Buffon. Les Reptiles sont classés d'après Daudin et Lacépède.

Tous les individus, dont il est fait mention, existent dans le Cabinet de l'auteur, à l'exception de quelques

Mammifères et d'un très-petit nombre d'Oiseaux ; il a scrupuleusement examiné le sexe et a pu se convaincre que quelques femelles avaient été données pour des mâles, et avaient servi à faire de nouvelles espèces. Cinq années de séjour dans le Poitou, au milieu des bois immenses de ces contrées, l'ont mis à même d'étudier les mœurs des oiseaux, et de rectifier quelques erreurs trop souvent répétées jusqu'à ce jour.

I.re CLASSE : MAMMIFÈRES.

ORDRE DES CARNASSIERS.

FAMILLE DES CHEIROPTÈRES.

1. *RHINOLOPHUS UNI HASTATUS, Rhinolophe unifer*, Geoffroi Saint-Hilaire.

LE GRAND FER A CHEVAL, Daubenton et Buffon, Histoire naturelle des quadrupèdes, édition in-4° de 1784, planche X, tom. 3.

Très-commun dans les combles et les caves du château de Larochefoucault.

2. *VESPERTILIO MURINUS*, Lin. *Vespertilion Murin.*

LA CHAUVE-SOURIS, Daub., Buffon, pl. VI, tom. 3.

Habite les mêmes lieux que la précédente.

3. *VESPERTILIO PIPISTRELLUS*, Lin., *Vespertilion Pipistrelle.*

LA PIPISTRELLE, Daub., Buff., pl. IX, tom. 3.

Les vieilles murailles, les masures, les chantiers de bois.

4. *PLECOTUS VULGARIS*, Geoff., *Vespertilio auritus*, Lin., *Vespertilion oreillard.*

L'Oreillard, Daub., Buffon., pl. VII, tom. 3.

Les masures, les caves du château de Larochefoucault, les grottes de Saint-Marc.

FAMILLE DES INSECTIVORES.

5. *ERINACEUS EUROPÆUS*, Lin., Cuvier, Geoff.

Le Hérisson, Buff., pl. II, tom. 3.

Se tient dans les jardins, les bois, et particulièrement les haies ; commun.

6. *SOREX ARANEUS*, Lin.

La Musaraigne, Buff., pl. III, tom. 3.

Les jardins, les vieux murs, les endroits contenant des substances en décomposition ; commun.

7. *SOREX DAUBENTONII*, Erxleben, Blumenbac.

La Musaraigne d'eau, Buff., pl. III, tom. 3.

Je n'en ai encore vu qu'un seul individu, que j'ai pris en 1836, à la campagne, dans un fossé ; assez rare.

8. *TALPA EUROPÆA*, Lin., Erxl.

La Taupe, Buff., pl. IV, tom. 3.

Très-commune dans les prairies, les jardins. Pendant les inondations elle quitte le bas des prairies pour se retirer dans les endroits les plus élevés.

FAMILLE DES CARNIVORES.

9. *MELES EUROPÆUS*, *Ursus Meles*, Lin., *Taxus Meles*, Geoff.; *Meles vulgaris*, Cuvier.

Le Blaireau, Buffon, pl. XLIII, tom. 3.

Assez rare dans le département ; ravage quelquefois les champs de maïs.

10. *MUSTELA PUTORIUS*, Lin.

Le Putois, Buff., pl. XLVII, tom. 2.

Assez commun dans les habitations rurales, les bois, les tas de pierres, se loge aussi dans un terrier d'où lui est venu ici le nom de *Fouin de terre.*

11. *MUSTELA FURO*, Lin.

Le Furet, Buff., pl. XLVIII et XLIX, tom. 2.

Quelques personnes élèvent pour la chasse aux lapins, le furet blanc et la variété connue sous le nom de *Furet putois.*

12. *MUSTELA VULGARIS*, Lin.

La Belette, Buff., pl. L, tom. 2.

Se rencontre dans les terres cultivées, les bois, les vieux murs, les habitations rurales où elle fait la guerre aux rats ; la nuit elle grimpe sur les arbres dont elle parcourt les branches pour saisir les petits oiseaux ; elle mange aussi les lézards verts avec lesquels elle se bat avec acharnement.

13. *MUSTELA ERMINEA*, Lin.

L'Hermine, le Roselet, Buff., pl. L. et L.?, tom. 2.

Très-rare dans le département.

14. *MUSTELA FOINA*, Lin.

La Fouine, Buff., pl. XLV, tom. 2.

Commune dans toutes les habitations, les granges, les vieilles masures, se blottit dans les greniers, parmi les tas de planches, où elle emporte les œufs qu'elle peut saisir, grimpe sur les cerisiers et les figuiers, dont elle mange le fruit ; appelée *fouin.*

15. *LUTRA VULGARIS*, Erxlb. *Mustela Lutra*, Gmelin.

La Loutre, Buff., pl. XLIV, fig. 1 et 2, tom. 2.

Sur les bords de la Charente, dans les étangs et les viviers qu'elle dépeuple souvent de poisson ; peu commune.

16. *CANIS LUPUS*, Lin.

Le Loup, Buff., pl. XLI, tom. 2.

Se rencontre, mais en petite quantité, dans les forêts de la Braconne, sorte de bois blanc ; devient tous les jours plus rare, depuis qu'on arrache les bois.

17. *CANIS VULPES*, Lin., Cuvier.

Le Renard, Buff., pl. XLII, tom. 2.

Commun dans tous les grands bois du département.

18. *CANIS FAMILIARIS*, Lin.

Les variétés qui se rencontrent dans les campagnes sont : *le Mâtin*, pl. Ire. ; *le Chien du Berger*, pl. IV ; dans les villes, ce sont : *le Braque*, pl. IX ; *le Chien courant*, pl. VIII ; *le Basset*, pl. XI, *le Barbet*, pl. XIII ; *le Bul-Dogue, le Doguin*, pl. XX ; *le Dogue* de forte race, pl. XXI, tom. 2, etc., etc.

19. *VIVERA GENETTA*, Lin., *Genetta vulgaris*, Cuv.

La Genette, Buff., pl. XLV, tom. 2.

Je n'en ai vu que trois individus apportés au marché à des époques assez éloignées ; elle se trouve dans les grands bois, entre Larochefoucault et Confolens ; Rare : nommée *Chat-Pitois*.

20. *FELIS CATUS DOMESTICUS*.

Le Chat domestique, Buff., pl. XXIII, tom. 2.

Je n'ai aucune connaissance que le Chat sauvage ait été rencontré dans le département, quoiqu'une variété assez commune s'en rapproche beaucoup.

ORDRE DES RONGEURS.

21. *MUS DECUMANUS*, Lin., Gmel.

Le Surmulot, Buff., pl. XIV, tom. 3.

Très-commun partout ; se tient dans les greniers, les

caves, les latrines, les boucheries; compose son nid avec de la paille, de vieux chiffons, mange les œufs, les petits poulets; est quelquefois atteint d'albinisme.

22. *MUS RATTUS*, Lin., Gmel., *Rattus niger*, Pennant.

Le Rat, Buff., pl. LIII, tom. 2.

Moins commun que le précédent, habite les caves, les greniers, et surtout les boulangeries.

23. *MUS SYLVIATICUS*, Pallas, Gmel., *Mus domesticus medius*, Lin.

Le Mulot, Buff., pl. LV, tom. 2.

Les bois, les champs, les jardins, où il dévaste les semis de pois et de fèves; lorsqu'ils commencent à pousser, il les déterre la nuit et les emporte dans sa retraite; commun.

24. *MUS MUSCULUS*, Lin., Pall., Erxlb.

La Souris, Buff., pl. LIV, tom. 2.

Très-commune partout; souvent atteinte de la maladie albine.

25. *LEMNUS AMPHIBIUS*, *Mus amphibius*, Lin.

Le Rat d'eau, Buff., pl. LVI, tom. 2.

Très-commun sur les bords de la Charente, des petites rivières de l'intérieur du département, des fossés, des viviers; se nourrit de frai de poisson; ronge la tige et la racine de l'iris des marais (*Iris Pseudo acorus*); mange aussi quelquefois les céréales qui sont placées près des rivières.

26. *LEMNUS ARVALIS*, *Mus arvalis*, Lin.

Le Campagnol, Buff., pl. LVII, tom. 2.

Les berges des fossés qui bordent les champs, les bosquets, les bois, les promenades publiques, au-dessous de la ville; peu commun.

27. *MYOXUS NITELA*, Gmel. *Sciurus quercinus*, Erxlb.

Le Lerot, Buff., pl. XII, tom. 3.

Les jardins, les vergers ; se retire l'hiver, au nombre de quatre ou cinq, dans des trous de murailles, où il reste engourdi ; peu commun.

28. *SCIURUS VULGARIS*, Lin.

L'Écureuil, Buff., pl. LII, tom. 2.

Se rencontre dans les bois de Saint-Adjutori, près de Larochefoucault, et les environs de Confolens ; assez rare.

29. *LEPUS TIMIDUS*, Lin.

Le Lièvre, Buff., pl. XXXV, tom. 2.

Assez commun dans tout le département de la Charente.

30. *LEPUS CUNICULUS*, Lin., Erxlb.

Le Lapin, Buff., pl. XXXVI, tom. 2.

Commun dans tous les côteaux boisés et les roches du département. Dans les environs d'Angoulême, on élève assez la variété domestique.

31. *CAVIA COBAYA*, Lin.

Le Cochon d'inde, Buff., pl. I, tom. 3.

Cette espèce de rongeur est peu répandue. Très-peu de personnes l'élèvent.

ORDRE DES PACHYDERMES.

32. *SUS SCOFRA FERUS* et *Sus scofra domesticus*. Lin.

Le Sanglier, Buff., pl. X, tom 1.

Ne se rencontre qu'accidentellement dans les forêts de la Braconne, d'Orte et de Bois-Blanc. Les variétés domestiques élevées dans le département de la Charente, sont la variété blanche du Bas-Poitou, et la variété pie ou du Périgord.

33. *EQUUS CABALLUS*, Lin.

Le Cheval, Buff., pl. I, tom. 1.

La race des Chevaux, dans le département de la Charente, est très-mélangée ; ce n'est guère que dans les communes,

de Rouillac, Cygogne, Mérignac, qu'on élève la race poitevine et bretonne, pour les diligences et le roulage ; les chevaux fins y sont en très-petite quantité.

34. *EQUUS ASINUS*, Lin.

L'ANE, Buff., pl. II, tom. 1.

Est assez généralement répandu dans les parties élevées du département ; les arrondissements de Cognac, Barbezieux, Ruffec, élèvent une grande quantité de fort beaux mulets. Les étalons sont tirés du Mirebalais ou commune de Mirebeau (département de la Vienne).

35. *CERVUS*, Lin.

LE CERF, Buff., pl. XXVII, tom. 2.

Un bois de Cerf fossile a été trouvé en 1835, à la poudrière royale de Basseau, près d'Angoulême, à 5 pieds et quelques pouces de profondeur (1 mètre 70 centimètres), dans le terrain d'alluvion, à peu de distance du lit actuel de la Charente.

Deux autres bois de Cerf fossile ont été trouvés, en 1841 et en 1842, dans les prairies tourbeuses de la Roche-Andrie, à 12 kilom. Sud d'Angoulême.

36. *CAPRA HIRCUS*, Lin.

LA CHÈVRE, Buff., pl. VI et VII, tom. 1.

Peu répandue dans le département, n'est élevée que dans le canton de Blanzac et les environs de Ruffec, pour la fabrication des fromages ; dans cette dernière localité seulement.

37. *OVIS ARIES*, Lin., Erxlb.

LE MOUTON, Buff., pl. IV et V, tom. 1.

L'espèce du mouton, dans le département de la Charente, peut être divisée en trois races, 1.° la race flamande qui se trouve dans les arrondissements de Cognac, Barbezieux et le canton de Rouillac ; 2.° la race Poitevine, moins forte

que la précédente, élevée dans l'arrondissement de Ruffec, et la partie inférieure de la Charente ; 3.° la plus petite des trois (dite race du Berry), qui peuple les parties sèches et élevées du département.

38. *BOS TAURUS*, Lin.

Le Boeuf, Buff., pl. III, tom. 1.

Race Augoumoisine et Limousine. Les communes de Vitrac et Montambœuf fournissent une grande quantité de veaux, d'un an, qui approvisionnent en partie le département; parmi les bœufs adultes on rencontre aussi les races Auvergnates et Gasconnes.

OISEAUX.

ACCIPITRES DIURNES.

1. *CIRCUS ÆRUGINOSUS*, Vieillot, *Falco æruginosus*, Latham.

Busard de marais, Buff., pl. enluminée 424.

Peu commun ; le bord des rivières, les marais de Moutiers, où il niche.

2. *CIRCUS GALLINARIUS*, Vieillot, *Falco pygargus* et *cyaneus*, Lath.

Oiseau de Saint-Martin, Buff., pl. enlumin., 443 la femelle, 459 le mâle. Assez rare ; ne se voit guère qu'au moment du passage, en Octobre.

3. *CIRCUS MONTAGIU*, Vieillot, *Falco cinerarius*, Montagu.

Le Busard Montagu, nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle, page 411, tom. 31. Une femelle a été tuée en Octobre 1829, au moment du passage ; rare.

4. *BUTEO FASCIATUS*, Vieill., *Falco Buteo*, Lath.

La Buse, Buff., pl. enlum., 419.

L'été elle habite les grands bois et les forêts de la Braconne, d'Orte. L'hiver elle se répand dans les campagnes pour chasser ; commune, nommée *Cossarde*.

5. *BUTEO APIVORIUS*, Vieill., *Falco Apivorius*, Lath.

La Bondrée, Buff., pl. enlum. 420.

Niche dans les grands bois, la forêt de la Braconne ; se nourrit de larves de guêpes, souterraines, qu'elle déterre ; assez commune.

6. *FALCO MILVUS*, Lin.

Le Milan, Buff., pl. enlum. 422.

Rare ; de passage. Trois individus seulement ont été tués dans les environs de la ville. (?)

7. *FALCO TINNUNCULUS*, Lath.

La Cresserelle, Buff., pl. enlum., 401 le mâle, et 471 la femelle.

Habite les trous des rochers des environs du Château-du-Diable, pierre dure, etc., nommée *oiseau bareau*, *Pripri* ; très-commun.

8. *SPARVIUS NILUS*, Vieill., *Falco Nilus*, Lath.

L'Épervier, Buff., pl. enlum., 467 le mâle, et 412 la femelle.

Se tient, l'été, dans les bois ; ne paraît dans les plaines qu'à l'arrière-saison. Commun ; nommé *Emouchet*.

ACCIPITRES NOCTURNES.

9. *STRIX ULULA*, Lath.

La Chouette, ou la grande *Cheveche*, Buff., pl. enlum. 438.

Habite les grands bois, se trouve quelquefois dans la campagne, où elle chasse en plein jour ; émigre à l'arrière-saison. Peu commune.

10. *STRIX PASSERINA*, Lath.

La Cheveche ou la petite *Chouette*, Buff., pl. enlum. 439.

Assez commune dans les bois, les vieux édifices où elle niche ; émigre à l'automne.

11. *STRIX STRIDULA*, Lath.

Le Chat-Huant, Buff., pl. enlum. 437.

Dans les grands bois, les forêts de la Braconne, d'Orte ; rare.

12. *STRIX FLAMMEA*, Lath.

L'Effraie ou *Fresaie*, Buff., pl. enlum. 440.

Commune dans les trous des murs de la Cathédrale et de la tour du Télégraphe ; fait la chasse aux Chauve-Souris, aux Mulots. On la regarde comme un oiseau de très-mauvais augure ; sédentaire

13. *STRIX ALUCO*, Lath.

La Hulotte, Buff., pl. enlum. 441.

Se tient dans la forêt de la Braconne ; émigre à l'automne. Peu commune.

14. *STRIX OTUS*, Lath.

Le Hibou, ou *Moyen-Duc*, Buff., pl. enlum. 29.

Commun partout ; émigre même assez tard.

15. *STRIX SCOPS*, Lath.

Le Scops ou *Petit-Duc*, Buff., pl. enlum. 436.

Très-commun ; pendant les belles nuits du printemps et de l'été, il fait entendre son chant monotone et désagréable ; part en Septembre.

OISEAUX SYLVAINS.

16. *PICUS VIRIDIS*, Lath.

Le Pic-Vert, Buff., pl. enlum. 879 le mâle, et 371 la femelle.

Attaque les peupliers, les trembles, les chênes, dans le tronc desquels il niche ; nommé *Picateau*. Commun.

17. *PICUS MAJOR*, Lath.

L'Épeiche ou *Pic varié*, Buff., pl. enlum. 196 le mâle et 595 la femelle.

Les grands bois, la forêt de la Braconne, de Chardon ; rare.

18. *PICUS VARIUS*, Lath.

Le Pic varié, à tête rouge, Buff., pl. enlum. 611.

Se tient dans les grands bois de l'Est du département de la Charente. La femelle diffère du mâle par le bec, qui est une fois moins long et moins fort.

19. *PICUS MINOR*, Lath.

Le Petit Pic varié Buff., pl. enlum. 598, fig. 1, le mâle, fig. 2, la femelle.

Dans les grands bois des environs de Larochefoucault, la forêt de la Braconne : cet oiseau fait entendre un bruit *grrro, grrro*, très-fort, répété plusieurs fois de suite, à des intervalles très-rapprochés, en frappant à coups redoublés sur les parties sèches des chênes t lorsqu'il cherche une cavité où il puisse loger son nid : ce n'est qu'à l'aide de ce bruit que j'ai pu le découvrir dans les forêts et les bois qu'il habite, et m'assurer que ce son « n'était pas produit par le frottement » du bec de la Sitelle contre des branches sèches et creuses ». (Article *Sitella*, tom. V, pag. 467, et note *M*, pag. 468 de l'Histoire naturelle de Buff., édition in-4.° de 1778). Lorsque le petit Pic frappe les arbres, il est dans une position perpendiculaire, la tête en haut et le corps immobile, les muscles du cou agissent seuls et impriment à la tête des mouvements tellement rapides, qu'on peut à peine les distinguer.

20. *YUNX TORUQUILLA*, Lath.

Le Torcol, Buff., pl. enlum. 698.

Très-commun partout ; arrive en Avril, part à la fin d'Août, se nourrit de fourmis, et devient excessivement gras à l'arrière-saison.

21. *CUCULLUS CANORUS*, Lath.

Le Coucou, Buff., pl. enlum., 811 le mâle.

Arrive dans les premiers jours d'Avril, part au commencement d'Août ; commun. La femelle, qui a été méconnue ou mal observée, a été donnée pour une espèce particulière; j'en offre la description, prise sur un individu que je possède. Un œuf arrivé à terme et que j'ai retiré de ce même individu, ne laisse aucun doute sur le sexe.

La tête, la gorge, le cou et le dessus des ailes ondées de noirâtre et de roussâtre ; les pennes des ailes noirâtres, tachetées de roux sur le bord externe et interne, terminées de blanc, rayées transversalement de ces deux couleurs du côté intérieur et en dessous ; la poitrine, d'un blanc sale, avec des bandes transversales noirâtres, rares sur le ventre et les couvertures de la queue, qui sont d'un blanc sale; les plumes du croupion, et les couvertures supérieures de la queue, d'un roux plus foncé que le dos, les pennes caudales coupées par des lignes anguleuses, rousses et noires et tachetées de blanc près de la tige, et l'extrémité blanche ; le bec couleur de corne, les pieds jaunes.

22. *LOXIA CURVIROSTRA*.

Le Bec croisé, Buff., pl. enlum., 218.

Ne se rencontre guères que tous les cinq ans; ils arrivent en Mai et repartent en Novembre. Ce sont assez ordinairement de forts coups de vents de Sud qui nous les amènent. En 1835, ils parurent en grand nombre. Dans les environs de Ruelle, ils endommagèrent les pommes dont ils tiraient les pépins pour leur nourriture.

23. *LOXIA PYRRHULA*, Lath., *Pyrrhula Europæa*, Vieillot.

Le Bouvreuil, Buff., pl. enlum. 145, fig. 1, le mâle ; fig. 2, la femelle.

De passage au printemps et à l'automne ; séjourne très-peu dans le département de la Charente. Les oiseleurs en prennent facilement un assez grand nombre.

24. *LOXIA COCCOTHRAUSTES*, Lin.

Le Gros Bec, Buff, pl. enlum., 99 le mâle, et 100 la femelle.

Habite les grands bois, niche sur les arbres élevés des plaines ; peu commun, passe toute la belle saison dans le département. Nommé Pinson d'Ardennes, d'Auvergne.

25. *FRINGILLA CARDUELIS*, Lath.

Le Chardonneret, Buff., pl. enlum. 4, fig. 1.

Se réunit en bandes nombreuses à l'automne, se repose sur le chardon étoilé (*Centaurea calcitrapa*), dont il recherche avidement la graine ; vient dans les jardins et près des habitations pendant l'hiver. Nommé *Chardonnet*.

26. *FRINGILLA SPINUS*, Lath.

Le Tarin, Buff., pl. enlum. 485, fig. 3.

Arrive à l'automne, part au printemps ; se tient en grand nombre sur les aulnes, dont il mange la graine ; commun.

27. *FRINGILLA DOMESTICA*.

Le Moineau, Buff., pl. enlum. 6, fig. 1, le mâle, et 55 le jeune.

Très-commun partout, et surtout près des moulins à blés, niche sous les tuiles, près des entablements et dans des pots de terre, qu'on suspend aux murs, fait trois couvées par an. Nommé *Pierrot* ; quelquefois atteint d'albinisme.

28. *FRINGILLA MONTANA*, Lath.

Le Friquet, Buff., pl. enlum. 267, fig. 1.

Commun dans les bois et dans les jardins ; fait son nid dans des trous de murs, s'empare des nids de Pics abandonnés ; se réunit en troupes nombreuses au commencement de l'hiver. Nommé *Moineau Caborne*.

29. *FRINGILLA ITALIÆ*, Vieill.

Le Moineau à tête marron ou d'*Italie*, Nouv. Diction. d'Hist. nat., tom. XII, pag. 199, article *Fringille*.

De passage à l'automne, se réunit au Moineau ; commun. Je ne l'ai observé qu'une fois, en 1834.

30. *FRINGILLA LINOTA* et *CANABINA*, Lath.

La Linotte, Buff., pl. enlum. 151, fig. 2 et 485, fig. 1 le mâle, 151, fig. 1, la femelle.

Très-commune partout. Nommée *Linot*.

31. *FRINGILLA CÆLEBS*, Lath.

Le Pinson, Buff., pl. enlum. 54, fig. 1, le mâle.

Très-commun ; se réunit l'hiver aux Moineaux et se tient avec eux près des maisons et dans les basses-cours ; fait son nid dans les arbres peu élevés des jardins et des bosquets.

31. *FRINGILLA MONTIFRINGILLA*.

Le Pinson d'Ardennes, Buff., pl. enlum. 54, fig. 2, le mâle.

De passage en automne ; séjourne très-peu de temps.

33. *FRINGILLA PETRONIA*.

Le Moineau des Bois ou la *Soulcie*, Buff., pl. enlum. 225.

Commun dans les bois et les plaines ; fait son nid dans les trous d'arbres et particulièrement dans ceux des noyers, d'où lui est venu le nom de *Moineau de Noyer*, qu'on lui donne dans ce pays-ci ; fait deux pontes par an. La femelle ne dif-

fère du mâle que par la tache jaune du cou moins prononcée chez elle.

34. *LOXIA CHLORIS*, Lath.

Le Verdier, Buff., pl. enlum. 267, fig. 2.

Commun dans les champs, les jardins ; nommé *Bruant*. Sédentaire.

35. *EMBERIZA CITRINELLA*, Lath.

Le Bruant, Buff., pl. enlum. 30, fig. 1.

Commun ; se tient dans les taillis, les haies, les champs cultivés. Sédentaire ; nommé *Verdoie*.

36. *EMBERIZA HORTULANA*, Lath.

L'Ortolan, Buff., pl. enlum. 247, fig. 1.

Commun dans les bois et sur les arbres des plaines ; vers la fin d'Août il se retire dans les vignes et devient alors excessivement gras et farouche : arrive dans les premiers jours du printemps et part à l'automne. Nommé *Binetu*.

37. *EMBERIZA MILIARIA*, Lath.

Le Proyer, Buff, pl. enlum. 233.

Commun ; niche dans les prairies ; le mâle, dans les premiers jours du printemps, se tient sur un arbre où il ne cesse de chanter.

38. *EMBERIZA SCHOENICULUS*, Lath.

L'Ortolan de roseaux, Buff., pl. enlum. 247, fig. 2, le mâle, et 497 la femelle.

Ne paraît en assez grand nombre qu'à l'automne, se tient dans les haies qui bordent les champs, et dans les saules et les aulnes qui bordent les rivières.

39. *EMBERIZA CIRLUS*, Lath.

Le Zizi ou *Bruant de haie*, Buff., pl. enlum. 653, fig. 1 et 2, mâle et femelle.

Rare ; se tient dans les bois, les taillis.

40. *PARUS CÆRULEUS*, Lath.

La Mésange bleue, Buff., pl. enlum. 3, fig. 2.

Commune dans les bois pendant la belle saison ; l'hiver, elle se tient dans les jardins et s'approche des habitations. Nommée *Petite Cendrille*.

41. *PARUS MAJOR*, Lath.

La Charbonnière ou *Grosse Mésange*, Buff., pl. enl. 3. fig. 1.

Commune partout ; habite toute l'année les bois et les jardins. Nommée *Grosse Cendrille*.

42. *PARUS ATER*, Lath.

La Petite Charbonnière, Buff., Oiseaux, tom. V, pag. 400, Edit. in-4°.

Je ne l'ai vue qu'au mois de Janvier dernier (1842), dans les environs de la ville et dans le Jardin-Public ; ne paraît qu'accidentellement.

43. *PARUS CAUDATUS*, Lath.

La Mésange a longue queue, Buff., pl. enlum. 502, fig. 3.

Habite les bois et les bosquets pendant la belle saison ; l'hiver elle se tient sur les arbres des champs, des jardins et proche des habitations.

44. *ORIOLUS GALBULA*, Lath.

Le Loriot, Buff., pl. enlum. 26, le mâle.

Arrive en Avril, part en Août ; commun dans tous les grands bois et sur les arbres élevés des plaines. Les jeunes mâles portent, pendant la première et la seconde année, la livrée des femelles, ce qui pourrait les faire prendre pour ces dernières. Nommé *Louriou*.

45. *STURNUS VULGARIS*, Lath.

L'Étourneau, Buff., pl. enlum. 75.

Arrive par bandes nombreuses en automne ; se tient alors dans les prairies et les terres cultivées, pour repartir dans les premiers jours de Février ; niche dans des trous de Pics abandonnés.

46. *CORVUS CORONE*, Lath.

La Corbine ou *Corneille Noire*, Buff., pl. enlum. 483.

Se tient dans les grandes forêts, l'été ; l'hiver elle parcourt les campagnes en troupes très-considérables. Nommée *Grolle*.

47. *CORVUS FRUGILEGUS*, Lath.

Le Freux ou *la Frayonne*, Buff., pl. enlum. 484.

Se rencontre dans les mêmes lieux que l'espèce précédente, voyage comme elle et quelquefois avec elle. Dans les hivers très-rigoureux, ces oiseaux s'approchent des habitations et entrent dans les basses-cours pour chercher leur nourriture dans les fumiers.

48. *CORVUS CORNIX*, Lath.

La Corneille mentelée, Buff., pl. enlum. 76.

Ne paraît que dans l'hiver ; les endroits où elle se trouve le plus facilement, sont les environs de Ruffec et les bois, entre Larochefoucault et Confolens. Assez rare.

49. *CORVUS PICA*, Lath.

La Pie, Buff., pl. enlum. 488.

Très-commune partout, mais particulièrement dans les îles de la Charente, plantées de peupliers et d'aulnes ; elle enlève quelquefois les très-jeunes poussins et dévaste les champs de maïs nouvellement ensemencés. Les paysans pensent généralement qu'elle annonce une année orageuse lorsqu'elle place son nid à une élévation peu considérable. Nommée *Ajasse*.

Quelquefois elle est atteinte d'albinisme : un individu de cette couleur a été tué près d'Angoulême, en 1828.

50. *CORVUS GLANDARIUS*, Lath.

Le Geai, Buff., pl. enlum. 481.

Commun ; habite tous les grands bois du département de la Charente ; émigre quelquefois à l'automne.

51. *HIRUNDO RUSTICA*, Lath.

L'Hirondelle de cheminée ou *Domestique*, Buff., pl. enlum. 543, fig. 1.

Commune dans les villes et les campagnes ; arrive du 28 Mars au 1.er Avril, part du 15 au 20 Octobre et quelquefois plus tard : elle place son nid sous les hangards et aux chevrons des planchers de maisons, et jamais dans les cheminées (pour ce pays-ci), ce que j'attribue à l'étroitesse du tuyau, qui ne lui permet pas d'y entrer en volant ; elle est très-sensible au froid, j'en ai souvent vu dans les premiers jours d'Octobre et par des gelées blanches, réunies au nombre de quatre et cinq dans le même nid ; rester ainsi jusqu'à ce que la température plus élevée leur permît de sillonner l'air.

Au mois d'Avril 1837, un vent de Nord violent ayant soufflé pendant quelques jours et occasionné un froid d'un ou deux degrés au dessous de zéro du thermomètre de Réaumur, il en périt un grand nombre, que l'on trouva gelées.

52. *HIRUNDO URBICA*, Lath.

L'Hirondelle à croupion blanc ou *de fenêtre*, Buff., pl. enlum. 542, fig. 2.

Très-commune à Angoulême et dans les autres villes, mais surtout à la poudrière royale de Basseau. Nommée *Cul blanc*; arrive du 20 au 30 Avril, part au 15 Octobre.

53. *HIRUNDO CINEREA*, Lath.

L'Hirondelle de Rivage, Buff., pl. enlum. 543, fig. 2.

Commune le long des bords de la Charente.

54. *HIRUNDO APUS*, Lath. *Cypselus Apus*, Vieill.

Le Martinet noir, Buff., pl. enlum. 542, fig. 1.

Très-commun partout. Le clocher de la Cathédrale, la tour du télégraphe et des prisons. Arrive du 30 au 1.er Mai, part au 15 Août.

55. *CAPRIMULGUS EUROPÆUS*, Lath.

L'Engoulevent, Buff., pl. enlum. 193.

Peu commun dans les bois où il se tient habituellement; arrive en Avril, part en Septembre; se nourrit de Lèpidoptères nocturnes, de Coléoptères; se charge d'une graisse excessive.

56. *MUSCICAPA GRISOLA*, Lath.

Le Gobe-Mouche, Buff., pl. enlum. 565, fig. 1.

Très-commun partout; arrive en Avril, part un peu tard à l'automne.

57. *MUSCICAPA ATRICAPILLA*, Lath.

Le Gobe-Mouche de Lorraine, Buff., pl. enlum. 565, fig. 2 et 3.

Très-rare, de passage au printemps et à l'automne.

Peu d'oiseaux ont donné lieu à autant de fables que celui-ci. Son plumage ne varie pas autant qu'on s'est plu à le dire, et ne change pas plusieurs fois dans la même année. Les mâles ne prennent la couleur noire et blanche qu'à la troisième année; jusqu'à cette époque, ils portent la livrée grise de la femelle. Deux mâles de cette espèce, que j'ai eu, l'un au 25 Avril 1839, et qui est en habit de noces; l'autre au 16 du même mois 1842, qui est en plumage gris, me confirment dans ce que j'avance. Dans cette espèce, comme dans toutes les autres, le plumage se ternit après la saison des amours, mais ne change pas au point d'être méconnaissable.

58. *MUSCICAPA FICEDULA*.

Le Gobe-Mouche Bec-Figue.

Très-commun dans les bois pendant toute la belle saison.

C'est avec raison que Bechestein a fait de cet oiseau une espèce particulière ; si je me suis conformé à son opinion, c'est que j'ai pu m'assurer que lorsque ce Gobe-Mouche arrive au printemps, dans le département de la Charente, comme dans celui de la Vienne, il porte la même livrée qu'à l'automne, et que des milliers d'individus qui habitent les bois pendant toute cette époque, ne m'ont offert aucune différence et aucune variation dans le plumage. Ce ne peut être un Gobe-Mouche noir, sous son habit d'hiver, ni une femelle, ni un jeune, puisque ces deux espèces ne se rencontrent jamais ensemble, que le Gobe-mouche noir est rare et de passage et ne séjourne au plus que huit jours et que le Bec-Figue est commun ; qu'il niche et habite ce département depuis le printemps jusqu'à l'automne.

59. *LANIUS EXCUBITOR*, Lath.

La Pie Grièche Grise, Buff., pl. enlum. 445.

Peu commune ; ..... les bois et plus particulièrement les plaines ; niche dans les noyers.

60. *LANIUS MINOR*, Lath.

La Pie Grièche d'Italie, Buff., pl. enlum. 32.

Assez commune dans les plaines, se perche sur les grands peupliers et autres grands arbres au temps de la pariade ; les mâles volent en planant autour des arbres sur lesquels sont posées les femelles ; ils les poursuivent avec acharnement. Quelques individus mâles et femelles, ont les plumes de la poitrine colorées en rose tendre ; cette couleur est plutôt la marque distinctive des adultes que celle d'une espèce ou variété ; arrive au mois d'Avril, part en Septembre.

61. *LANIUS RUTILUS*, Lath.

La Pie Grièche Rousse, Buff., pl. enlum. 9, fig. 2, le mâle ; la femelle a les couleurs du plumage d'une teinte plus claire et moins prononcée.

Commune dans les bois et les plaines ; elle imite très-bien le chant des petits oiseaux qu'elle cherche à attirer pour les dévorer ; niche sur les arbres peu élevés, dans les bosquets, les vergers ; arrive et part aux mêmes époques que la précédente. Nommée *Batajasse*.

62. *LANIUS COLLURIO*, Lath.

L'Écorcheur, Buff., pl. enlum. 31, fig. 2 le mâle, et fig. 1, la femelle, sous le nom de *Pie Grièche Rousse*, femelle.

Peu commun ; se tient sur la lisière des bois, dans les haies, arrive et part comme les précédentes.

63. *TURDUS MERULA*, Lath.

Le Merle, Buff., pl. enlum. 2, et le mâle, 555 la femelle..... ?

Très-commun dans les bois, les bosquets, les haies, les jardins ; quelquefois atteint d'albinisme. Un individu presqu'entièrement blanc a été tué en 1839, près de Mont-Moreau, à huit lieues Sud d'Angoulême.

64. *TURDUS TORQUATUS*, Lath.

Le Merle a Plastron Blanc, Buff., pl. enlum. 516, le mâle ; la femelle se distingue par la couleur gris-enfumé et roussâtre du collier.

Assez commun dans la vallée du Château-du-Diable et dans les environs du Petit Rochefort, près d'Angoulême. Séjourne à peu près huit jours.

65. *TURDUS MUSICUS*, Lath.

La Grive, Buff., pl. enlum. 406.

Commun dans les bois pendant l'été ; se tient dans les vignes à l'époque des vendanges.

66. *TURDUS VISCIVORIUS*, Lath.

La Draine, Buff., pl. enlum. 489.

Habite les grands bois du département ; sédentaire. Nommée *Trec*.

67. *TURDUS PILARIS*, Lath.

La Litorne, Buff., pl. enlum. 493.

Arrive à la fin d'Octobre, séjourne jusqu'en Février, se tient et vole toujours par troupes très-nombreuses. Le soir elle quitte les grands arbres des plaines pour gagner les bois où elle passe la nuit. Nommée *Fia Fia*.

68. *TURDUS ILIACUS*, Lath.

Le Mauvis, Buff.; pl. enlum. 51.

Arrive à l'automne, part au printemps ; se réunit en troupes excessivement nombreuses au moment du départ.

69. *TURDUS ARUNDINACEUS*, Lath.

La Rousserolle, Buff., pl. enlum. 513.

Sur les bords de la Charente et des autres petites rivières, parmi les roseaux à balais (*Arundo pragmites*), à la tige desquels elle se tient accrochée ; place son nid au milieu des Iris (*Iris pseudo acorus*), se nourrit d'insectes, de guêpes, bousiers, etc.; arrive au printemps, émigre à l'automne. Nommée *Tire-arrache*.

70. *ACCENTOR MODULARIS*, Vieill. *Sylvia Modularis*, Lath.

Le Traine Buisson, ou *Mouchet*, ou *Fauvette d'hiver*, Buff., pl. enlum. 615, fig. 1.

Se tient dans les bois, les bosquets, les haies. L'hiver il s'approche des lieux habités et se rencontre dans les jardins.

71. *MOTACILLA OENANTHE*, Lath.

Le Motteux, Buff., pl. enlum. 554, fig. 1, le mâle, fig. 2, la femelle.

Arrive au printemps, part à l'automne ; très-commun dans les endroits arides, nommés chaumes, se tient de préférence

sur les vieux murs, les tas de pierres où il niche. Nommé *Cul Blanc*.

72. *OENANTHE RUBETRA*, Vieill. *Sylvia*, *Rubetra*, Lath.

Le Tarier, Buff., pl. enlum. 678, fig. 2 le mâle.

Dans les chaumes et les bruyères, arrive au printemps, séjourne pendant tout l'été ; assez rare.

73. *SYLVIA RUBICOLA*, Lath.

Le Traquet, Buff., pl. enlum. 678, fig. 1 le mâle.

Sur les haies qui bordent les prairies, les buissons, les tiges de maïs ; assez commun, sédentaire. Nommé *Grasset*.

74. *ALAUDA ARVENSIS*, Lath.

L'Alouette, Buff., pl. enlum. 360.

Très-commune dans toutes les terres cultivées.

75. *ALAUDA ARENARIA*, Vieill.

L'Alouette Calandrelle, Vieill.

Très-commune dans les endroits arides et incultes, les chaumes de Cruge, vis-à-vis Angoulême.

76. *ALAUDA CRISTATA*, Lath.

Le Cochevis, Buff., pl. enlum. 503, fig. 1.

Dans les champs pendant le temps des couvées et toute la belle saison. L'hiver elle est assez commune sur les grandes routes, où elle cherche les grains non digérés dans le crottin des chevaux; vient dans les jardins, les basses-cours. Nommée *Alouette Dupée*.

77. *ALAUDA CRISTATELLA*, Lath.

Alouette Lulu, Buff., pl. enlum., 503, fig. 2.

Habite l'été les clairières des bois, les chaumes. L'hiver elle vient dans les plaines, se perche quelquefois en grand nombre sur les arbres.

79. *ANTHUS AQUATICUS*, Meyer, *Alauda Campestris*, Lath.

Pipi Spipolette, sous le nom d'*Alouette pipi*, Buff., pl. enlum. 661, fig. 2.

Commune dans les prairies, sur le bord de la Charente; l'hiver elle vient dans les jardins, autour des habitations.

80. *ANTHUS ARBOREUS*, Bechst., *Alauda pratensis*, Lath.

Pipi des arbres, sous le nom de *Farlouse*, Buff., pl. enlum. 660, fig. 1.

Se plaît dans les bois et dans les clairières. Le mâle se tient une partie de la journée sur un arbre près du nid de sa femelle et fait entendre un ramage des plus agréables et presque continuel. Assez rare; émigre.

81. *MOTACILLA ALBA*, Lath.

La Lavandière, Buff., pl. enlum. 652.

Commune dans les prairies et les terres labourées; à l'époque des semailles elle suit la charrue pour saisir les vers et les larves que le soc met à découvert.

82. *MOTACILLA BOARULA*, Lath.

La Bergeronnette jaune, Buff., pl. enlum. 28.

Peu commune: se tient sur le bord de la Charente, dans les endroits vaseux, sur les herbes flottantes et sur tous les lieux humides des chemins.

83. *MOTACILLA FLAVA*.

La Bergeronnette de printemps, Buff., pl. enlum. 674.

Se rencontre dans les mêmes lieux que la précédente et a à peu près les mêmes habitudes, niche dans les prairies élevées. Peu commune.

84. *SYLVIA ÆDONIA*, Vieill. — Sylvia hortensis, Sylvia parserina.

La petite Fauvette, Buff., pl. enlum. 579, fig. 2.

Les bosquets, les haies, les jardins. Assez commune. De passage.

85. *SYLVIA GARRULA*, Bechst. — Sylvia curruca, Sylvia Dumetorum, Lath.

La Fauvette babillarde, Buff., pl. enlum. 580, fig. 3.

Les bosquets, les haies, les arbres touffus des jardins. Niche dans les haies à peu près à 1 mètre de hauteur. De passage. Nommée *Gorgelette*.

86. *SYLVIA CINEREA*, Lath.

La Fauvette grise, Buff., pl. enlum. 579, fig. 3.

Les haies, les bosquets, les broussailles. De passage. Commune.

87. *SYLVIA ATRICAPILLA*, Lath.

La Fauvette a tête noire, Buff., pl. enlum. 580.

Arrive des premiers à la fin de Mars. Se tient alors dans les lierres pour se répandre un peu plus tard dans les taillis, les jardins. Assez commune.

88. *SYLVIA POLYGLOTTA*, Vieill.— Sylvia Hippolaïs, Bechst.

La Fauvette Luciniole ou Polyglotte, Nouv. Dict. d'hist. nat., tom. XI, p. 200, article *Fauvette*.

Dans les jeunes taillis, les endroits fourrés où elle chante continuellement en se tenant perpendiculairement aux branches.

89. *SYLVIA COLLYBITA*, Vieill.— Sylvia Rufa, Bech., Meyer.

Le Pouillot collybite, Nouv. Dict. d'hist. nat., tom. XI, p. 235, article *Fauvette*.

Les bois, les jardins. Arrive dès le mois de Mars. Commun.

90. *SYLVIA FITIS*, Meyer.

Le Pouillot fitis, Nouv. Dict. d'hist. nat., tom. XI, p. 237, article *Fauvette*.

Dans les grands bois, les bosquets. Arrive en Avril, part à la fin de Septembre. Commun.

91. *SYLVIA SYLVICOLA*, Lath. — Sylvia sibilatrix, Meyer.

Le Pouillot sylvicole, Nouv. Dict. d'hist. nat., Tom. XI, p. 239, article *Fauvette*.

Les mêmes lieux. Arrive et part aux mêmes époques que le précédent.

92. *SYLVIA FLAVIVENTRIS*, Vieill. — Sylvia trochilus, Lath.

Le Pouillot a ventre jaune, Nouv. Dict. d'hist. nat., Tom. XI, p. 241, article *Fauvette*.

Mêmes lieux et de passage à la même époque.

93. *SYLVIA LUCINIA*, Lath.

Le Rossignol commun, Buff., pl. enlum. 615, fig. 2.

Très-commun partout.

94. *SYLVIA PHOENICURUS*, Lath.

Le Rossignol de muraille, Buff., pl. enlum 351, fig. 1 et 2, mâle et femelle.

Habite le département depuis le mois d'Avril jusqu'en Septembre. Dans les bois, les taillis. Peu commun.

95. *SYLVIA TITHYS*, Lath.

Le Rouge-queue tithys, Nouv. Dict. d'hist. nat., T. XI, p. 269, article *Fauvette*.

Arrive aux mêmes époques que le précédent; se tient dans les taillis, les haies qui bordent les champs et les chemins.

96. *SYLVIA RUBECULA*, Lath.

Le Rouge-Gorge, Buff. pl. enlum. 361, fig. 1.

Se tient l'été dans les grands bois. L'hiver il vient dans les jardins et dans les lieux habités. Commun et sédentaire. Nommé *Prusse*.

97. *SYLVIA SUECICA*, Lath.

La Gorge bleue, Buff., pl. enlum. 361, fig. 2 et 610, fig. 1, 2, 3. Mâle, femelle et jeune.

De passage en Septembre, séjourne environ quinze jours. Rare.

98. *REGULUS CRISTATUS*, Lath.

Le Roitelet, Buff. pl. enlum. 651.

Très-commun dans les bois et les grands jardins. Arrivé à l'automne, part au printemps. Nommé *OEil-de-Bœuf*.

99. *TROGLODYTES EUROPÆA*, Vieill. — Sylvia troglodytes, Lath.

Le Troglodytes, Buff. pl. enlum. 651, fig. 2.

Les bois, les bosquets, les haies, les jardins et tous les lieux habités. Fait son nid dans le lierre, les vieilles masures abandonnées; sédentaire. Nommé *Roi-Bertaud*.

100. *SITTA EUROPÆA*, Lath.

La Sitelle; Buff., pl. enlum. 623, fig. 1.

Les grands bois du département, la forêt de la Braconne; sédentaire. Assez commune.

La Sitelle grimpe comme les Pics, mais je ne lui ai jamais vu frapper les arbres ainsi que le font ces derniers pour en faire sortir les insectes. Elle ne fait entendre des coups, presque aussi forts et aussi mesurés que ceux du Pic-vert, que lorsqu'elle a quelqu'objet à briser. Elle le place alors dans une fente d'arbre ou dans les interstices de l'écorce et se tenant perpendiculairement la tête en bas, elle se soulève en s'aidant un peu des ailes pour ajouter tout le poids de son corps à la force qu'elle emploie. Cette opération paraît très-pénible pour elle. Je ne me suis jamais aperçu qu'elle creuse les arbres pour établir son nid. Elle profite des vieux trous de Pics abandonnés. Elle se rencontre toujours en grand nom-

bre, dans certains lieux des bois qu'elle affectionne, et jamais en solitude.

101. *PETRODOMA MURARIA*, Vieill. — CERTHIA MURARIA, Lath.

LE GRIMPEREAU DE MURAILLE, Buff., pl. enlum. 372, fig. 1 et 2.

Se rencontre sur les murs du château de la Roche-Andrie, de la cathédrale et quelquefois les rochers de Giget. Rare.

102. *CERTHIA FAMILIARIS*, Lath.

LE GRIMPEREAU, Buff. pl. enlum. 681, fig. 1.

Très-commun partout. Nommé *Gravillon*. Sédentaire.

103. *UPUPA EPOPS*, Lath.

LA HUPPE, Buff., pl. enlum. 52.

Commune dans les bois, les champs cultivés. Arrive au printemps; séjourne jusqu'à l'automne. Nommée *Puput*.

104. *ALCEDO ISPIDA*, Lath.

LE MARTIN PÊCHEUR, Buff., pl. enlum. 77.

Assez commun pendant l'été sur la Charente et les autres petites rivières. Devient plus rare l'hiver. Nommé *Pêche-Martin*.

105. *COLUMBA LIVIA*, Lath.

LE BISET, Buff., pl. enlum. 510.

Commun. Partout en domesticité. Nommé *Fuyard*.

106. *COLUMBA PALUMBUS*, Lath.

LE PIGEON RAMIER, Buff., pl. enlum., 316.

De passage à l'automne; séjourne peu dans les grands bois où il se nourrit de glands, se charge d'une graisse abondante, vole en troupes nombreuses. Nommé *Palombe*.

107. *COLUMBA ÆNAS*, Lath.

LE PIGEON SAUVAGE, Nouv. Diction. d'Hist. nat., tom. XXVI, pag. 365.

Arrive et part aux mêmes époques que le précédent. Mêmes mœurs. Moins commun.

108. *COLUMBA TURTUR*, Lath.

La Tourterelle des Bois, Buff., pl. enlum. 394.

Arrive au printemps, habite les grands bois frais et ombragés, se répand en troupes nombreuses dans les chenevières ensemencées et les endommage jusqu'à ce que la graine ait commencé à lever. Nommée *Tourte*.

GALLINACÉS.

109. *PERDIX RUFA*, Lath. — Perdix saxatilis, Meyer.

La Bartavelle, Buff., pl. enlum. 230.

Sur les côteaux du département. Rare.

110. *PERDIX RUFA*, Lath.

La Perdrix Rouge, Buff., pl. enlum. 150.

Assez commune dans tout le département.

111. *PERDIX CINEREA*, Lath.

La Perdrix Grise, Buff., pl. enlum. 27.

Moins commune que la précédente.

112. *PERDIX COTURNIX*, Lath.

La Caille, Buff., pl. enlum. 178.

Très-commune dans certaines années, assez rare dans d'autres, se tient dans les prairies, les champs de blé.

ECHASSIERS.

113. *OTIS TARDA*.

La Grande Outarde, Buff., pl. enlum. 245.

Très-rare, ne paraît que dans les hivers très-rigoureux; je n'en ai vu que trois individus tués à peu de distance d'Angoulême, en 1829.

114. *OEDICNEMUS EUROPÆUS*, Vieill. *Otis OEdicnemus*, Lath.

Le Grand Pluvier, Buff., pl. enlum. 919.

Très-commun dans les endroits élevés et arides, nommés chaumes, où il se nourrit d'insectes et principalement de l'Hélice ruban (*Helix Ericetorum*), qui s'y trouve en grande quantité ; arrive au printemps, part dès les premières gelées blanches. Nommé *Courlis*.

115. *HIMANTOPUS ALBICOLLIS*, Vieill. — *Chradrim Huantopus*, Lath.

L'Échasse, Buff., pl. enlum. 878.

Un individu a été tué en 1835 sur les bords de la Touvre, près de la fonderie royale de Ruelle, et donné à M. Seganzin, officier d'artillerie. Rarissime.

116. *CHARADRIUS PLUVIALIS* et *APRICARIUS*, Lath.

Le Pluvier doré, Buff., pl. enlum. 904, en plumage d'hiver.

Très-commun ; de passage en hiver et au printemps, se tient le soir, par bandes considérables, dans les prairies humides. Nommé *Pivier*.

117. *CHARADRIUS MINOR*, Meyer.

Le Petit Pluvier a collier, Buff., pl. enlum. 921.

Très-rare, ne se rencontre qu'accidentellement ; un mâle et une femelle ont été tués en 1840, sur les bords de la Charente.

118. *VANELLUS CRISTATUS*, Meyer, *Tringa Vanellus*, Lath.

Le Vanneau, Buff., pl. enlum. 242.

De passage ; se tient dans les terres fraîchement labourées et les prairies humides : assez commun.

119. *TRINGA ALPINA*, Lath., — *Tringa variabilis*, Meyer.

L'Alouette de Mer, Buff., pl. enlum. 850.

Se tient sur les bords de la Charente, les alluvions ; elle a, comme les *Hoche-Queue*, un mouvement de la queue, voltige d'un bord à l'autre ; sédentaire et de passage. Assez commun.

120. *TRINGA EQUESTRIS*, Lath.

Le Chevalier, Buff., pl. enlum. 844.

De passage sur les bords des rivières ; assez rare.

121. *TOTANUS CALIDRIS*, Vieill., *Scolopax Calidrix*, Lath.

Le Chevalier aux Pieds Rouges, Buff., pl. enlum. 845.

De passage en hiver ; assez rare.

122. *TRINGA OCHROPUS*, Lath.

Le Bécasseau ou *Cul-Blanc*, Buff., pl. enlum. 843.

Habite les bords de la Charente et des autres petites rivières du département, les marais de Veuil. Peu commun ; séjourne une partie de la belle saison.

123. *SCOLOPAX GALLINAGO*, Lath.

La Bécassine, Buff., pl. enlum. 883.

Arrive à l'automne ; se tient sur les bords de la Charente, dans les marais de Breuty, de Veuil ; commune.

124. *SCOLOPAX GALLINULA*, Lath.

La Petite Bécassine ou *la Sourde*, Buff., pl. enl. 884.

Dans les marais de Breuty, de Veuil, de la Roche-Andrie et dans toutes les prairies inondées. Aussi commune que la précédente. Arrive aux mêmes époques.

125. *RUSTICOLA VULGARIS*, Lath.

La Bécasse, Buff., pl. enlum. 885.

Se tient dans les bois et dans presque tous les terrains humides. Commune. Arrive en Octobre. Très-abondante dans les marchés.

126. *NUMENIUS ARQUATUS*, Lath. — *Scolopax arquata*, Gmel.

Le Courlis, Buff., pl. enlum. 818.

De passage à l'automne et au printemps. Assez rare.

127. *ARDEA MAJOR*, Lath.

Le Héron, Buff., pl. enlum. 755 et 787.

Se tient le long des bords de la Charente et dans les marais, se perche quelquefois sur les arbres qui bordent les viviers. Devient très-gras l'hiver. Lorsque la proie lui manque, il se nourrit de plantes aquatiques : je n'ai pu en reconnaître l'espèce, ce qui était contenu dans le gésier d'un individu, que j'ai préparé, formant une espèce de pâte.

128. *ARDEA MONTICOLA*. *Picot* de Lapeyrouse.

Le Héron Montagnard, Nouv. Dict. d'hist. nat., tom. XIV, p. 416. Article *Héron*.

Très-rare ; se rencontre accidentellement. Un individu mâle de cette espèce a été tué en 1830.

129. *ARDEA MINUTA*, Lath.

Le Blongios, Buff., pl. enlum. 323.

Se tient dans les herbes et les broussailles épaisses des îles de la Charente, celles de Bardines, près d'Angoulême. En petit nombre. Arrive en Avril et Mai.

130. *ARDEA STELLARIS*, Lath.

Le Butor, Buff. pl. enlum. 789.

Habite les joncs, les roseaux des bords et des îles de la Charente et des marais de Veuil ; assez rare. Nommé *Buor*.

131. *PLATELEA LEUCORODIA*, Lath.

La Spatule, Buff., pl. enlum. 405.

Un individu a été tué en 1837 au pont de la Chabanne sur la petite rivière du Bandia, près de Larochefoucault. De passage accidentel. Rarissime.

132. *CICONIA ALBA*, Vieill. — *Ardea Ciconia*, Lath.

La Cigogne blanche, Buff., pl. enlum. 866.

Une seule a été tuée en 1828 parmi une troupe considérable qui s'était abattue dans des prairies au moment du passage. Se rencontre très-rarement.

133. *GRUS CINEREA*, Bechst. — *Ardea grus*, Lath.

La Grue, Buff., pl. enlum. 769.

De passage régulier en Novembre et en Mars. Traverse le département par bandes très-considérables. S'arrête dans les champs nouvellement ensemencés, dans les orges (*hordeum vulgare*), les orges baillarges ou à deux rangs (*hordeum distichon*) dont elle mange le grain. On en tue souvent quelques-unes. Quatre beaux individus ont été apportés à Angoulême en Mars 1841.

134. *RALLUS AQUATICUS*, Lath.

Le Rale-d'Eau, Buff., pl. enlum. 749.

Se tient sur les bords de la Charente, dans les roseaux de la Touvre et les marais de Veuil. De passage et sédentaire. Assez commun.

135. *RALLUS CREX*, Linn. — *Gallinula crex*.

Le Rale-de-Gênet, Buff., pl. enlum., 750.

Arrive et part à peu près à la même époque que les cailles. Se tient dans les broussailles et les herbes épaisses et fourrées des marais desséchés, Assez rare.

136. *RALLUS PORZANA*, Linn. — *Gallinula maculata*, Lath.

La Marouette, Buff., pl. enlum. 751.

Dans les marais de Breuty, Veuil, la Roche-Andrie. Rare.

137. *FULICA CHLOROPUS*, Linn. — *Gallinula chloropus*, Lath.

La Poule-d'Eau, Buff., pl. enlum. 877.

Se tient dans les joncs et les roseaux de la Charente et de la Touvre; elle est en très-grande abondance dans cette petite rivière. L'hiver, on l'apporte en assez grande quantité au marché. Sédentaire et de passage. Nommée *Joselle*.

138. *FULICA ATRA*, Lath.

La Foulque, Buff., pl. enlum. 197.

Mêmes lieux que la précédente, mais beaucoup moins commune. Nommée *Morelle*.

139. *PHALAROPUS HYPERBOREUS*, Lath.

Le Phalarope cendré, Buff., pl. enlum. 766.

Un joli individu en plumage d'hiver a été tué en Octobre 1838, sur la Charente à 6 kilomètres, Ouest d'Angoulême. Ne se rencontre qu'accidentellement. Rarissime.

NAGEURS.

140. *PELECANUS CARBO*, Lath.

Le Cormoran, Buff., pl. enlum. 927.

Se rencontre quelquefois, mais rarement sur la Charente. De passage accidentel. Nommé *Petuche*, par les paysans.

141. *PODICEPS URINATOR*, Lath.

Le Grèbe, Buff. pl. enlum. 941.

Ne paraît que dans les hivers rigoureux et accidentellement. Plusieurs ont été tués et apportés au marché en Novembre 1830 et 1840. Rare.

142. *PODICEPS MINOR*, Lath.

Le Castagneux, Buff., pl. enlum. 905.

Commun sur la Charente et la Touvre. Nommé *Ripoton*. Sédentaire et de passage.

143. *PODICEPS CRISTATUS*, Lath.

Le Grèbe cornu, Buff., pl. enlum. 400.

Rarissime; ne s'est montré qu'une seule fois en 1830.

144. *COLYMBUS GLACIALIS*, Lath.

Le grand Plongeon, Buff., pl. enlum. 914.

Un individu a été pris vivant à Bardines, près d'Angoulême, en Janvier 1830. Très-rare. Ne paraît que dans les hivers très-rigoureux.

145. *MERGUS MERGANSER*, Lath.

Le Harle, Buff., pl. enlum. 951 et 953.

Paraît dans les hivers rigoureux en assez grande quantité. Plusieurs ont été tués et apportés au marché en 1830 et 1838.

146. *MERGUS MINUTUS*, Lath.

Le petit Harle, ou Piette, Buff., pl. enlum. 449 le mâle; 450 la femelle.

Ne se rencontre que dans les hivers rigoureux. Assez rare.

147. *ANCER CINEREUS*, Meyer.— *Anas Ancer*. Lath.

L'oie sauvage, Buff., pl. enlum. 985.

Arrive à l'automne par bandes très-nombreuses, se tient sur la Charente et dans les marais du département, est apportée au marché de la ville. Assez Commune.

148. *ANAS ALBIFRONS*, Lath.

L'oie rieuse, Buff., *Oiseaux*, tom. IX, p. 81.

Dans les hivers rigoureux. Peu commune.

149. *ANSER LEUCOPSIS*, Bechst. — *Anas erytropus*, Lath.

La Bernache, Buff., pl. enlum. 855.

Très-rare. Ne paraît que dans les hivers très-intenses.

150. *CYGNUS FERUS*, Brisson.— *Anas cygnus*, Lath.

Le Cygne, Buff., *Oiseaux*, tom. IX, p. 1.

Ne se montre que dans les hivers très-rigoureux. Plusieurs ont été tués en 1830. Très-rare. La Touvre, petite rivière très-poissonneuse qui se jette dans la Charente à 2 kilomètres, Est d'Angoulême, en était peuplée du temps de Henri-le-Grand.

151. *CYGNUS OLOR*, Vieill. — *Anas olor*, Lath.

Le Cygne domestique, Buff., pl. enlum. 913.

Une femelle de cette espèce a paru en 1830, parmi des cygnes sauvages, et a été tuée dans les environs d'Angoulême.

152. *ANAS CLANGULA*, Lath.

Le Garot, Buff. pl. enlum. 802.

De passage en hiver, sur la Charente et les marais. Assez commune.

153. *ANAS FERINA*, Lath.

Le Milouin, Buff., pl. enlum.; 803, le mâle.

De passage en hiver. Assez rare.

154. *ANAS FULIGINA*, Lath.

Le Morillon, Buff. pl. enlum. 1001, le mâle.

Paraît tous les hivers sur la Charente en assez grande quantité. Est très-souvent apporté au marché.

155. *ANAS ACUTA*, Lath.

Le Pilet ou Canard a longue queue, Buff., pl. enlum. 954, le mâle.

De passage l'hiver. Assez rare.

156. *ANAS BOSCHAS*, Lath.

Le Canard sauvage, Buff., pl. enlum. 776 et 777, mâle et femelle.

De passage l'hiver, sur la Charente et quelquefois dans les champs humides, où il se rend pour chercher sa nourriture. Commun.

157. *ANAS PENELOPE*, Lath.

Le Canard siffleur, Buff., pl. enlum. 825, le mâle.

Se voit en hiver sur la Charente et dans les marais. De passage. Assez rare.

158. *ANAS CLYPEATA*, Lath.

Le Souchet, Buff., pl. enlum. 971 et 972, mâle et femelle.

Assez commun sur la Charente. De passage en Novembre et Février. Est apporté au marché presque tous les hivers ainsi qu'une partie de ses congénères.

159. *ANAS TADORNA*, Lath.

Le Tadorne, Buff., pl. enlum. 53.

Ne paraît que dans les hivers rigoureux. Très-rare.

160. *ANAS CRECA*, Lath.

La petite Sarcelle, Buff., pl. enlum. 947.

Très-commune sur la Charente, les petites rivières et les marais du département. S'apporte en assez grande quantité au marché. De passage en hiver.

161. *LARUS CINERARIUS*, Lath.

La petite Mouette cendrée, Buff., pl. enlum. 969.

On ne la voit que l'hiver, en grande quantité, sur la Charente qu'elle remonte surtout pendant les inondations. Nommée *Hirondelle-de-Mer*.

162. *STERNA MINUTA*, Lath.

La petite Hirondelle de mer, Buff. pl. enlum 996.

Ne paraît qu'accidentellement sur la Charente.

163. *PROCELLARIA PELAGICA*, Lath.

L'oiseau de tempête, Buff., pl. enlum. 993.

Ne se montre qu'accidentellement. Un individu a été tué en 1840. Rarissime.

REPTILES.

SAURIENS.

1. *LACERTA OCELLATA*, Daudin.

Le Lézard vert ocellé, Daud. — Le Lézard vert, Lacépède.

Sur les côteaux pierreux et boisés du Château-du-Diable, les bords de la route de Limoges, près de la forêt de la Braconne. Peu commun.

2. *LACERTA VIRIDIS*, Daudin.

Le Lézard vert piqueté, Daud.— Le Lézard vert, Lacépède.

Très-commun dans les bois, les haies. Se place sur les buissons pour recevoir plus directement les rayons du soleil et chasser les insectes dont il se nourrit.

3. *LACERTA BILINEATA*, Daud.

Le Lézard vert a deux raies, Daud.

Peu commun. Je ne l'ai rencontré qu'une fois dans une vigne sur le penchant d'un côteau sablonneux exposé au midi, à 12 kilomètres, Sud-Est d'Angoulême.

4. *LACERTA AGILIS*, Daud.

Le Lézard gris, Daud. — Le Lézard gris, Lacép.

Très-commun partout, sur toutes les murailles et les remparts de la ville. Nommée *Angroise*.

OPHIDIENS.

5. *VIPERA BERUS*, Daud.

La Vipère commune, Daud. — La Vipère commune, Lacépède.

Se rencontre sur les côteaux boisés exposés au midi, dans la forêt de la Braconne. Elle se nourrit de jeunes reptiles et

quelquefois de ceux de son espèce. Le 15 Septembre 1835, je tuai dans le Poitou une vipère dont l'abdomen était très-volumineux; l'ayant préparée pour la conserver dans l'alcool, je tirai de son estomac cinq vipéreaux longs de 15 centimètres, qu'elle avait dévoré depuis peu.

6. *COLUBER VIRIDI FLAVUS*, Daud.

La Couleuvre verte et jaune, Daud. — La Couleuvre commune, Lacép.

Commune dans les vieux murs des jardins, des fours, les prairies, sur le bord des eaux, dans la petite garène au-dessus d'Angoulême. Nommée *Silan*.

7. *COLUBER NATRIX*, Daud.

La Couleuvre a collier, Daud. — La Couleuvre a collier, Lacép.

Commune sur les bords de la Charente, les fossés, les réservoirs. Nage très bien, se nourrit de crapeaux, de grenouilles.

8. *COLUBER VIPERINUS*, Daud.

La Couleuvre viperine, Daud.

Je ne l'ai rencontrée qu'une fois près du Mérigot, à 2 kilomètres Nord-Est de la ville.

BATRACIENS.

9. *HYLA VIRIDIS*, Daud.

La Rainette verte ou commune, Daud. — La Raine verte ou commune, Lacép.

Habite les bois frais et ombragés, les jardins; se tient constamment sur les arbres.

10. *RANA ESCULENTA*, Daud.

La Grenouille verte ou commune, Daud. — La Grenouille commune, Lacép.

Très-commune partout, sur les bords de la Charente, les marais, les fossés. Se mange très-rarement.

11. *RANA TEMPORARIA*, Daud.

La Grenouille rousse a tempes noires, Daud.— La Rousse, Lacép.

Dans les bois et les prairies humides. Peu commune.

12. *RANA PUNCTATA*, Daud.

La Grenouille ponctuée, Daud.

Je ne l'ai trouvée qu'une seule fois dans les environs de Chateauneuf, sur Charente.

13. *BUFO VULGARIS*, Daud.

Le Crapaud cendré, Daud. — Le Crapaud commun, Lacépède.

Très-commun partout, les jardins, la promenade publique au-dessous de la ville.

14. *BUFO BOMBINUS*, Daud.

Le Crapaud sonnant ou pluvial, Daud.— Le couleur de feu, Lacép.

Dans l'eau stagnante des chemins, des fossés, des mares, dans les jardins marécageux de l'Anguienne sous la ville. Très-commun. Nommé *Liron*.

15. *BUFO CALAMITA*, Daud.

Le Crapaud calamite, Daud. — Le Calamite, Lacép.

Commun sous les pierres, dans les vignes du petit Rochefort, à 4 kilom., Sud de la ville. Se trouve aussi au-dessous des remparts de la ville, mais en petite quantité.

16. *BUFO OBSTETRICANS*, Daud.

Le Crapaud accoucheur, Daud.

Très-commun au-dessous des remparts de la ville, la promenade publique, les jardins.

17. *BUFO SPINOSUS*, Bosc.

Le Crapaud épineux, Bosc, Daud.

Dans les jardins, les lieux humides. Se retire l'hiver dans les trous des murs, dans les tas d'herbes en décomposition exposés au midi. Peu commun.

18. *SALAMANDRA TERRESTRIS*, Daud.

La Salamandre terrestre, Daud. — La Salamandre terrestre, Lacép.

Peu commune. Les endroits humides et sombres, la poudrière royale de Basseau, les caves de l'ancien château de Mont-Moreau.

19. *SALAMANDRA CRISTATA*, Daud.

La Salamandre crêtée, Daud.

Peu commune. Les endroits où je l'ai trouvée le plus communément, sont les environs de Chateauneuf sur Charente. Dans la saison des amours elle se tient dans l'eau, et le mâle lorsqu'on l'inquiète, fait entendre un petit cri sourd. Nommée *Soufflet*.

20. *SALAMANDRA MARMORATA*, Daud.

La Salamandre marbrée, Daud.

Assez rare. Mêmes lieux que la précédente et quelquefois les environs des marais de Breuty.

21. *SALAMANDRA PALMIPES*, Daud.

La Salamandre palmipède, Daud.

Dans tous les fossés et principalement ceux de l'Anguienne et de la campagne des environs de Chateauneuf sur Charente. Commune.

22. *SALAMANDRA PALUSTRIS*, Daud.

La Salamandre des marais.

Mêmes lieux que la précédente.

A. Tremeau de Rochebrune.