

REPTILES Y ANFIBIOS

DE GALICIA,

POR

DON VÍCTOR LOPEZ SEOANE.

(Sesion del 9 de Mayo de 1877.)

Cuando en 1866 dimos á luz nuestra *Reseña de la Historia natural de Galicia*, con objeto de formar parte de la Historia de Galicia del Sr. Murguia, ni pudimos descender á grandes detalles, ni entónces teníamos hecho un estudio detenido de las colecciones erpetológicas, recogidas durante nuestra larga permanencia en varias provincias de España; tarea difícil hallándonos completamente aislados en un extremo de la Península, entregados por lo tanto á nuestras débiles fuerzas.

Sin embargo, los repetidos viajes que emprendimos por España y el extranjero, nos permitieron examinar las ricas colecciones de Lóndres, París, Viena, Berlin y otras muchas de España, Alemania, Austria, Hungría, Baviera, Inglaterra, Italia, Suiza y Portugal, así como oír las advertencias de los más eminentes profesores europeos. La excursion que hizo al Ferrol el sabio director del Museo de Viena, señor Steindachner, ha contribuido poderosamente á disipar las dudas que son consiguientes, cuando no se tienen facilidades de consulta. Éste, tan modesto como eminente naturalista, tuvo la bondad de estudiar nuestras colecciones española y filipina, corrigiendo cuanto error hayamos podido cometer.

Consultadas las obras que, ya generales ó de la Península y Baleares se han publicado, llegamos á formar una coleccion, si no exenta de faltas, al ménos lo mejor estudiada que nos ha sido posible.

Como no emitimos más datos que los recogidos por nosotros mismos, podemos responder de su exactitud.

La clasificación que adoptamos, como la más generalmente admitida, es la del Sr. Bonaparte (Ch. L.), en su *Amphibia europæa*.

Limitamos por hoy nuestra tarea á la enumeracion de los reptiles y anfibios de las cuatro provincias de Galicia, esperando en breve hacerlo de los restantes de España, Portugal y Baleares, para lo cual contamos con gran acopio de materiales propios, á los cuales agregaremos las indicaciones de los recogidos en los Museos y obras nacionales y extranjeras.

Cumple ántes de terminar, tributar públicamente el testimonio de nuestra gratitud á los señores Milne-Edwards, profesor del Museo de París; Steindachner, del de Viena y Barboza del de Lisboa, á quienes principalmente somos deudores de las mayores atenciones, y de importantes trabajos referentes al objeto, que han tenido la bondad de remitirnos.

Ferrol 24 de Febrero de 1877.

CLASE.—REPTILES.

ÓRDEN.—QUELÓNIOS.

FAM. Quelónidos.

GÉN. *Chelonia* Bonaparte.

1. *Ch. mydas*, Linneo.—Nombre vulgar en Galicia, *Tortuga marina* ó simplemente *tortuga*.

Habita en las rias de Vigo y Arosa, donde suele aparecer raras veces; y aún en la de Pontevedra.

GEN. *Thalassochelys* Fitzinger.

2. *Th. caretta*, Linn.—Vulg. *Tortuga carey*.

Hab. en las rias del Ferrol, Vigo y Arosa, aunque raras veces se pueda coger; más frecuente es verla en la costa cantábrica que dentro de las rias.

GEN. **Sphargis** Merrem.

3. **Sph. coriacea**, Linn.—Sin nombre vulgar propio.

Hab. Un sólo ejemplar hemos recogido en la ria de Vigo en 1849.

FAM. **Testudínidos.**

GEN. **Emys** Bonaparte.

4. **E. lutaria**, Linn.—Vulg. *Sapo concho*.

Hab. En las lagunas de San Pedro de Muro, entre Noya y Arosa, y acaso en otras de Galicia, siendo raro á causa de lo mucho que se le persigue.

ÓRDEN.—**SÁURIOS.**

FAM. **Lacértidos.**

GEN. **Tropidosaura** Boié.

5. **T. algira**, Linn.—Sin vulgar propio.

Hab.? Incluimos con duda esta especie como de Galicia, por más que nos inclinemos á creer que la hallamos en los montes de la provincia de Orense; pero como poseemos ejemplares de las provincias del centro y Mediodía de España, preferible es mantenerse en la duda.

GEN. **Zootoca** Wagler.

6. **Z. vivipara**, Jacquin.—Sin vulgar propio.

Hab. En los montes de Orense, Pontevedra, Santiago, Ferrol, etcétera, siendo en todos escasa.

GEN. **Lacerta** Linneo.

7. **L. stirpium**, Daud.—Vulg. *Lagartixa*.

Hab. En los montes, peñascales, ruinas, llanos, bosques, y en suma, en todas partes de Galicia, siendo comunísima.

8. *L. viridis*, Linn.—Vulg. *Lagarto*.

Hab. En las laderas de los montes, en los muros, peñascales, entre las malezas, setos, etc. de Orense, Ferrol, Pontevedra, Vivero y Tuy. Escaso en todas partes.

Var. bilineata.—Vulg. Como el anterior.

Hab. Hemos visto tan sólo dos ejemplares en la sierra del Caurel en la provincia de Lugo, siendo por consiguiente aún más escasa que el tipo.

Muchas más variedades podríamos consignar, tanto de ésta como de la especie anterior, algunas descritas por los señores Duméril y Bibron, en su magnífica *Erpetologie générale*; pero juzgándolas más bien dependientes de la edad, creemos lo más prudente hacer de ellas caso omiso.

GEN. **Thimon** Tschudi.9. *Th. ocellatus*, Daud.—Vulg. *Lagarto asnal*.

Hab. En los troncos de los árboles, entre las piedras, y más generalmente en las fortalezas y edificios solitarios y arruinados.

Es comun en toda Galicia, llegando á adquirir gran tamaño.

GEN. **Podarcis** Wagler.10. *P. muralis*, Laur.—Vulg. *Lagartixa*.

Hab. En los jardines, muros, setos y laderas de los montes de toda Galicia. Comunísima. Presenta muchas variedades de color y tamaño.

GEN. **Psammodromus** Fitzinger.11. *Ps. hispanicus*, Fitz.—Sin vulgar propio, aunque conocido como todas las especies con el de *Lagartixa* (lagarto chico) y *Lagarto* (los grandes).

Hab. En las montañas de Lugo, aunque escaso.

GEN. **Acanthodactylus** Fitzinger.

12. **A. Boschianus**, Daud.—Vulg. Como los anteriores.

Hab. En los parajes áridos entre las piedras.

GEN. **Eremias** Fitzinger.

13. **E. variabilis**, Dum et Bib.—Vulg. Como sus congéneres.

Hab. En las cercanías de Tuy.

FAM. **Ánguidos.**

GEN. **Gongylus** Wagler.

14. **G. ocellatus**, Dum. et Bib.—Sin vulgar propio.

Hab.º Mezclados los ejemplares de Galicia con otros de varias provincias, consignamos con duda la existencia de esta especie, aunque conservemos idea de haberla observado en la provincia de Pontevedra hace bastantes años.

GEN. **Seps** Merrem.

15. **S. chalcides**, Linn.—Sin vulgar propio ó *Escancer*.

Hab. En las laderas de las montañas entre los brezos, deslizando con tal velocidad, que se hace dificilísimo el cogernos. No escasea cerca de Santiago, Ferrol, Vigo, Tuy, Cabañas, Padron, Villagarcía, Caldas y otros puntos.

GEN. **Anguis** Linneo.

16. **A. fragilis**, Linn.—Vulg. *Escancer*.

Habita y es comun en los terrenos cultivados y húmedos de las cercanías del Ferrol, Santiago y otros puntos de Galicia.

Dos especies perfectamente distintas existen en Galicia; pero temiendo equivocarnos, diferimos su publicacion ínterin no consultamos la nueva especie.

ÓRDEN.—OFIDIOS.

FAM. Colúbridos.

GEN. *Cœlopeltis* Wagler.

17. *C. monspessulana*, Herm.—Sin vulgar propio.

Hab. En los montes y laderas de toda Galicia, cobijándose en los muros, esquilmos, debajo de las piedras, etc.

GEN. *Zacholus* Fitzinger.

18. *Z. austriacus*, Laur.—Vulg. Como á todas las culebras, llaman á ésta en Galicia, *Cóbra* y *Cóbrega*.

Hab. En los tejados de las casas, en los corrales y entre las piedras, en Neda y otros puntos de Galicia. En 1856 y 1872, la hemos recogido dentro de las aguas sulfurosas de Cúntis, á una temperatura de 26° Reaumur, asegurándonos los bañeros que solian verse algunas veces, aunque nos inclinemos á creer que caigan del techo de los baños.

GEN. *Callopeltis* Bonaparte.

19. *C. flavescens*, Scop.—Vulg. Como los anteriores.

Hab. En los montes y bosques de toda Galicia.

GEN. *Rhinechis* Michaelles.

20. *Rh. scalaris*, Schinz.—Vulg. *Cóbra* y *Cóbrega*.

Hab. En los pinares, entre los brezos y debajo de las piedras, en varios puntos de Galicia.

GEN. **Natrix** Laurenti.

21. **N. tessellata**, Laur.—Vulg. Como los anteriores.

Hab. En los prados y parajes humedecidos por los riachuelos, en varios puntos de Galicia.

22. **N. viperina**, Latr.—Vulg. Como los anteriores.

Hab. En los riachuelos y aguas estancadas de toda Galicia, así como en las vertientes de los montes, debajo de las piedras, etc. Comun.

23. **N. torquata**, Bp.—Vulg. Como los anteriores.

Hab. En las laderas de los montes de Cúntis y Neda. Escasa.

FAM. **Vipéridos.**

GEN. **Pelias** Merrem.

24. **P. berus**, Linn.—Vulg. *Vibora*.

Hab. Entre los matorrales y debajo de las piedras, en las vertientes de las montañas bajas de la provincia de Lugo, aunque rarísima.

GEN. **Vipera** Merrem.

25. **V. ammodytes**, Linn.—Vulg. *Vibora*.

Hab. En los montes con tojo alto expuestos al Mediodía, en los pinares, entre las malezas, esquilmos y debajo de las piedras, en Cabañas, Larage, Erines y otros puntos de Galicia, llegando hasta las orillas del mar.

Escasa en todas partes.

CLASE.—**ANFIBIOS.**ORDEN.—**RANAS.**FAM. **Ránidos.**GEN. **Rana** Linneo.

26. **R. esculenta**, Linn.—Vulg. *Rana*, *Rán*.

Hab. En los ríos, lagunas y aguas estancadas de toda Galicia.
Comun.

27. **R. temporaria**, Linn.—Vulg. Como la anterior.

Hab. En los prados y campos húmedos de toda Galicia, siendo tan comun como la anterior.

GEN. **Pelobates** Wagler.

28. **P. cultripes**, Cuv.—Vulg. *Sapiño*, *Sapo*.

Hab. En las huertas, prados y parajes húmedos del Ferrol, Santiago, Lugo, Mondoñedo, etc.

GEN. **Discoglossus** Otth.

29. **D. pictus**, Otth.—Vulg. Como el anterior.

Hab. En los sitios húmedos y pantanosos de las cercanías del Ferrol, Cabañas y otras localidades de Galicia.

GEN. **Alytes** Wagler.

30. **A. obstetricans**, Laur.—Sin vulgar propio, ó como los anteriores.

Hab. En los terrenos cultivados, debajo de los terrones ó piedras, en las Torres del Allo, Órdenes y Villalba.

GEN. **Hyla** Laurenti.

31. **H. arborea**, Linn.—Vulg. *Rana*, *Rán*.

Hab. En los prados húmedos, sobre los árboles y matas ó entre la yerba á las orillas de los rios de toda Galicia. Comun.

GEN. **Bufo** Laurenti.

32. **B. vulgaris**, Dum. et Bib.—Vulg. *Sapo*.

Hab. En agujeros ó debajo de las piedras, en las huertas, prados y sitios húmedos del Ferrol, Santiago, Lugo, Mondoñedo, Vivero, etc.

33. **B. Calamita**, Laur.—Vulg. Como el anterior.

Hab. En los bosques y sitios sombríos de las cercanías del Ferrol, Cabañas y Vivero.

34. **B. viridis**, Laur.—Vulg. Como los anteriores.

Hab. En agujeros ó debajo de las piedras y maderos, en los terrenos de labor, bodegas y sitios sombríos de toda Galicia. Comunísimo.

FAM. **Salamánderidos.**

GEN. **Pleurodeles** Michaelles.

35. **P. Waltli**, Dum. et Bib.—Sin vulgar propio.

Hab. En las aguas estancadas, riachuelos, bodegas y sitios húmedos, debajo de las piedras, etc. Raro.

GEN. **Salamandra** Laurenti.

36. **S. maculosa**, Dum. et Bib.—Vulg. *Pintiga*, *Pezoña*, *Sacaveira*.

Hab. En los rios y aguas estancadas, debajo de las piedras, en sitios húmedos, en los corrales, bodegas, etc. Comun.

Varía extraordinariamente de color y tamaño, que llega á ser considerable.

GEN. **Chioglossa** Barboza.

37. **Ch. lusitanica**, Barboza.—Sin vulgar propio ó como las siguientes especies.

Hab. En los sitios húmedos y márgenes de los ríos, debajo de las piedras. En 1849 hallamos por primera vez un individuo en las riberas del Tambre, conservándolo en la coleccion sin determinar.

El Sr. Barboza du Bocage, la observó en las inmediaciones de Coimbra y el Bussaco en Portugal, describiendo el género y la especie en la *Revue et Magazin de Zoologie*.—1864, p. 248, pl. 21, y en los *Proceedings Zool. Society of London*.—1864, p. 264, pl. 21.

A dicho señor debemos dos magníficos ejemplares de su nueva especie, que disiparon cuantas dudas pudiéramos tener acerca de nuestro hallazgo de Santiago.

GEN. **Triton** Laurenti.

38. **T. palustris**, Linn.—Vulg. *Lagartuxa*, *Sacarrancha*.

Hab. En los sitios húmedos debajo de las piedras, en los riachuelos y aguas estancadas de la provincia de Lugo. Raro.

39. **T. Gesneri**, Laur.—Vulg. Como el anterior.

Hab. En las charcas, fuentes, depósitos de agua, pozos y riachuelos de toda Galicia. Comun.

40. **T. parisinus**, Laur.—Vulg. *Lagartuxa*, *Sacarrancha*, como los anteriores.

Hab. En los mismos sitios que sus congéneres. Comunísimo.