


ANNUAIRE
DU
MUSÉE ZOOLOGIQUE
DE
L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES
DE ST.-PÉTERSBOURG.

TOME IV.
1899.

RÉDIGÉ PAR
W. Salensky et Eug. Büchner.

ÉDITION DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES.



ST.-PÉTERSBOURG.
IMPRIMERIE DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES.
Vass. Ostr., 9-ème ligne, № 12.
1899.

ЕЖЕГОДНИКЪ
ЗООЛОГИЧЕСКАГО МУЗЕЯ

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.


ТОМЪ IV.

1899.

ИЗДАННЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

В. В. Заленскаго и Е. А. Бихнера.

ИЗДАНИЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІА ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

(Вас. Остр., 9 лия., № 12).

1899.

**Пресмыкающіяся и амфибіи, собранныя А. Н.
Казнаковымъ въ путешествіи въ Шугнанъ и
Рошанъ.**

А. М. Никольскаго.

(Доложено 17 марта 1898).

Въ 1896 г. А. Н. Казнаковъ совмѣстно съ Акад. С. И. Коржинскимъ совершилъ интересное путешествіе въ два подвластныхъ Бухарѣ ханства Шугнанъ и Рошанъ. По пути онъ посѣтилъ бекства Кабадіанъ, Гиссаръ и Дарвазъ.

Настоящая замѣтка представляетъ списокъ амфибій и рептилій, собранныхъ А. Н. Казнаковымъ въ теченіе всего путешествія.

***Testudo horsfieldi* GR.**

№ 9023. Guzar. (2).

Въ коллекціи А. Н. Казнакова имѣются нѣсколько мелкихъ экземпляровъ этой черепахи изъ Гузара на югѣ отъ Самарканда.

***Gymnodactylus fedtschenkoi* STR.**

№ 9023. Igartschi (6).

„ 9024. Kabadian.

„ 9025. Totkaul (2).

„ 9026. Darvaz.

Экземпляры этого геккона, привезенные изъ Игарчи, представляютъ замѣтныя особенности; отъ типичныхъ представителей вида изъ Самарканда, они отличаются слѣдующими признаками: спинные бугорки уже и не такъ густо расположены,

цвѣтъ спины темнѣе; у нѣкоторыхъ экземпляровъ спина темно-сѣраго цвѣта безъ поперечныхъ полосъ; бедраиныхъ поръ 32—34, на брюхѣ 30—34 продольныхъ ряда чешуй.

Agama sanguinolenta PALL.

№ 9038. Ak-metschet (Babatau) (2).

„ 9039. Guzar (5).

„ 9040. Bischkent (2).

„ 9041. Kabadian (3).

Одинъ изъ экземпляровъ № 9039 походить на *A. isolepis* BLGR. въ томъ отношеніи, что ноздри у него помѣщаются выше бокового ребра морды, однако положеніе ноздрей не можетъ служить характернымъ признакомъ этого вида, такъ какъ положеніе это измѣнчиво; среди туркестанскихъ *A. sanguinolenta* попадаются экземпляры, у которыхъ ноздри находятся на самомъ ребрѣ; длина голени у *A. isolepis* болѣе длины черепа, у *A. sanguinolenta* голень не длиннѣе черепа, но и этотъ признакъ не имѣетъ діагностическаго значенія, такъ какъ разница въ длинѣ голени сравниваемыхъ видовъ очень незначительна и трудно уловима. У *A. isolepis* чешуя на брюхѣ гладкая или со слабо развитыми ребрышками, у *A. sanguinolenta* ребрышки эти развиты сильно; стало быть и эта послѣдняя разница имѣетъ тоже условное значеніе. Такимъ образомъ нѣтъ ни одного прочнаго признака для различенія названныхъ двухъ видовъ, поэтому *A. isolepis* BLGR. мы должны считать варіететомъ обыкновенной *A. sanguinolenta* PALL.

Stellio lehmanni STR.

№ 9027. Karategin (2).

„ 9028. Mont. ad fl. Wachs (2).

„ 9029. Nemitschi-Bole (1).

„ 9030. Ak-metschet (Baba-tau) (2).

„ 9031. Guzar (2).

„ 9032. Siachnar (2).

Окраска перечисленныхъ экземпляровъ весьма измѣнчива, ящерицы изъ Немичи-Боле (№ 9029) свѣтлаго цвѣта; изъ долины р. Вахшъ наоборотъ очень темныя, хотя голова свѣтло-сѣраго цвѣта почти безъ пятенъ; наибольшая длина 402 mm., хвостъ 252 mm.

Stellio himalayanus STEIND.

- № 9033. Kala-i-chum.
„ 9034. Darwaz (5).
„ 9035. Mont. ad fl. Pjandsch et Wachsch (2).
„ 9036. Mont. ad fl. Schach-dara (Schugnan) (5).
„ 9037. Sarez.

Все перечисленные экземпляры вполне отвѣчаютъ описанію этого вида въ каталогѣ Буленке¹⁾ и по сравненію съ экземпляромъ изъ Каргиля не представляютъ замѣтныхъ отличій. Двѣ ящерицы изъ долины Пянджа и Вакша отличаются особенно длиннымъ хвостомъ, у одной разстояніе отъ горловой складки до заднепроходнаго отверстія укладывается въ длинѣ хвоста $2\frac{3}{4}$ раза, у другой — 3 раза.

Phrynocephalus helioscopus PALL.

- № 9042. Tengi-charam prope Guzar.

Единственный экземпляръ этой круглоголовки, привезенный А. Н. Казнаковымъ, происходитъ изъ Тенги-Харама близъ Гузара.

Phrynocephalus strauchi NIK.

- № 9043. Kabadjan (3).

Видъ, описанный мной въ Herpetologia Turanica²⁾, привезенъ теперь А. Н. Казнаковымъ изъ Кабадыяна. Эти экземпляры отличаются слабо выраженной шероховатостью спины и тѣмъ, что на лопаткахъ у нихъ находятся по одному съ каждой стороны полукруглому свѣтлому пятну.

Phrynocephalus interscapularis LICHT.

- № 9044. Kabadian (6).

До сего времени эта круглоголовка не была находима такъ далеко на востокѣ; экземпляры А. Н. Казнакова отличаются крупными размѣрами, до 90 mm. въ длину, но никакихъ другихъ

1) Catal. Liz. Brit. Mus., I, p. 362.

2) Изв. М. Общ. Люб. Ест., XCIV, p. 21.

особенностей въ отличіе отъ тѣхъ же ящерицъ изъ западной части Туркестана не представляютъ.

Ophisaurus apus PALL.

- № 9057. Nemitschi-Bole in Darwaz.
„ 9058. Turkestan. 23. VI. 96 (2).

Varanus griseus MERR.

- № 9059. Chatti-robot in prov. Transcasp.
„ 9060. „ „

Eremias velox PALL.

- № 9048. Baba-tau (2).
„ 9049. ad fl. Wachschi.
„ 9050. Buzgali-kana.
„ 9051. „
„ 9052. Teng-i-charam (5).

Eremias intermedia STR.

- № 9045. Kabadian (5).
„ 9046. „
„ 9047. Baba-tau.

Отличаются довольно крупными размѣрами; одинъ экземпляръ № 9045 имѣетъ въ длину 171 мм., хвостъ 89 мм.

Scapteira grammica LICHT.

- № 9053. Jangi-arik in Kabadjan.

Scapteira scripta STR.

- № 9054. Kabadian (3).

Ablepharus brandti STR.

- № 9055. Nemitschi-bole (6).
„ 9056. Ak-Metschet in mont. Baba-tau.
„ 9145. Sagri-Descht in mont. Darwaz.
„ 9146. Tawil-dara in mont. Darwaz (2).

Ablepharus deserti STR.

№ 9147. Kitab in Buchara.

„ 9148. Urbs Buchara.

Ablepharus bivittatus MÉNÉTR.

№ 9149. Sagri-Decht in mont. Darwaz.

Typhlops vermicularis MERR.

№ 9063. Baldschuan in Buchara.

Eryx jaculus L.

№ 9064. Jangi-arik in Kabadian.

Tropidonotus tessellatus LAUR.

№ 9072. Charog in Schugnan.

„ 9073. Gissar.

Шугнанскіе экземпляры отличаются относительно очень крупными черными пятнами на спинѣ.

Zamenis rhodorachis JAN.

№ 9071. Darwaz.

Сверху оливково-сѣраго цвѣта съ неясными поперечными полосками, красной полосы на спинѣ нѣтъ.

Zamenis karelinii BDT.

№ 9068. Kabadjan.

Свѣтло-сѣраго цвѣта сверху съ черными поперечными полосками, расположенными въ три продольные ряда.

Zamenis diadema SCHLEG.

№ 9070. Kabadjan.

Zamenis ravergeri MÉNÉTR.

№ 9065. Charog in Schugnan.

„ 9066. Gissar.

„ 9067. Riwack in Schugnan.

Экземпляръ № 9066, длиной въ 220 мм., сверху сѣраго цвѣта, пятна спины слабо замѣтны, у экз. № 9067 наоборотъ пятна рѣзко выражены.

Zamenis glazunowi NIK.

№ 9069. Riwack in Schugnan.

Этотъ видъ, описанный мной³⁾ по экземплярамъ изъ Самаркандской обл., привезенъ теперь А. Н. Казнаковымъ изъ Шугнана; этотъ экземпляръ имѣетъ спину чернаго цвѣта съ тремя неправильными прерывающимися бѣлыми продольными полосами.

Coluber dione PALL.

№ 9074. Gissar.

„ 9075. Sufi-kurgan prope urb. Osch.

Taphrometopon lineolatum BDT.

„ 9076. Gissar.

„ 9077. Bischkent in Kabadjan.

„ 9078. Tongi-charam ad fl. Amu-darja super.

„ 9079. Kabadjan.

Экземпляръ № 9077 отличается тѣмъ, что черныя продольныя полосы едва замѣтны.

Vipera lebetina DAUD.

№ 9080. Darwaz.

Bufo viridis LAUR.

№ 2028. Diuwana in Karategin (5).

„ 2029. Kewron in Darwaz. (2).

„ 2030. fl. Bachsch.

„ 2031. Tawil-dara in Darwaz (2).

3) NIKOLSKY: Ann. Mus. Zool. Acad. Petersb., 1896, p. XIV.

Ежегодн. Зоол. Муз. 1899.

Одинъ изъ экземпляровъ № 2028 походить на *B. raddei* Stn. въ томъ отношеніи, что вдоль спины его тянется бѣловатая слабо замѣтная полоска, но конецъ 4-го пальца передней ноги значительно заходить за первое межфаланговое сочлененіе 3-го пальца, почему этотъ экземпляръ я и отношу къ виду *B. viridis* Laur.

