

*Lacerta pityusensis miguelensis* Eisentraut

*Lacerta pityusensis miguelensis* Eisentraut, Mitt. Zool. Mus. Berlin 14, 467 (1928)

Verbreitung: Isla Bosque de San Miguel, an der Nordküste Ibizas in der Bucht von San Miguel gelegen.

Material: 6 Männchen, 4 Weibchen (und 4 Exemplare in Verlust geraten), 10. 1928, GRÜN leg.

Kurze Charakterisierung der Insel

Das unmittelbar unter der Küste der Hauptinsel Ibiza in der Bucht von San Miguel liegende Eiland Bosque gehört zur Größenordnung IV. Da ich es aus eigener Anschauung nicht kenne, verdanke ich Herrn GRÜN die kurze Mitteilung, daß „Buschwerk und kleine Bäume“, offenbar Aleppokiefern, vorkommen. Dies deutet darauf hin, daß der Vegetationscharakter wohl noch dem der gegenüberliegenden ibizanischen Küste entspricht, und daß sich noch nicht in dem Maße wie auf kleinen, landfernen oder alten Inselchen eine Verarmung der Vegetation (Schwinden der hochwüchsigen Pflanzen) und ein Vorherrschen der Halophytenvegetation bemerkbar macht. Wir können wohl daraus schließen, daß Bosque de San Miguel erst in jüngerer Zeit losgetrennt worden ist.

Beschreibung der Eidechsen

Auch die Rasse *miguelensis* (Taf. V, Fig. 25) gehört zu den etwas stärker verdüsterten Rassen. Sie ist dadurch gekennzeichnet und unterscheidet sich von der nachfolgenden Form von Caldes, daß die grünen Farbtöne auf der Oberseite zurücktreten und einer olivbraunen Färbung Platz machen. Einige Tiere zeigen nur diese Braunfärbung. Die Zeichnung tritt in deutlicher, wenn auch teilweise unterbrochener Längsbänderung hervor. Die Seitenpartien und die Oberseite der Extremitäten sind heller oder dunkler olivbraun. Zwischen der hier ausgebildeten retikulierten Zeichnung finden sich hellere gelbbraune oder grünliche Ozellen. Die Unterseite variiert von grauweißlicher zu leuchtend ockergelber Färbung. Die Bauchrandschilder sind kobaltblau bis grünlichblau

gefleckt und haben außerdem deutlich ausgeprägte schwarze Tupfen. In all diesen Färbungs- und Zeichnungsmerkmalen ähnelt diese mittelgroße Rasse den auf den Inselchen und Eilanden zwischen Ibiza und Formentera vorkommenden Populationen, die in der Rasse *gastabiensis* vereinigt wurden.

Nr.	Geschlecht	G.L.	K.R.L.	Sch.L.	R.Sch.	R.Sch. K.L.	B.Sch.	Halsb.	Fem.	Lam.
1	♂ ad. Typus	179	68	111 reg.	61	43	26	12	l = 23, r = 24	31
2	♂ ad.	188	68	120 reg.	66	47	26	11	26	30
3	♂ ad.	167	68	99 reg.	64	43	27	13	l = 21, r = 22	30
4	♂ ad.	178	70	108 reg.	62	39	28	13	24	27
5	♂ ad.	160	65	95 reg.	62	46	27	13	23	27
6	♂ ad.	138	60	78 reg.	58	42	27	11	20	—
7	♀ ad.	144	62	82 reg.	60	40	29	13	22	28
8	♀ ad.	141	57	84 reg.	58	40	27	10	l = 23, r = 24	30
9	♀ ad.	168	58	110	52	35	28	12	21	28