

Lucèrte, Lucèrtula, Sèrpa de' muri, Argilèstru, Caliscèrtula, Zì-richèlta, ecc.

LUCERTOLA TIRRENICA

Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)

(Figg. 54, 55, 59)

F: Lézard tyrrhénien - T: Tyrrhenische Mauereidechse.

CARATTERI DISTINTIVI – V subrettangolari (fig. 8); 52-82 Sqd in linea trasversa a metà tronco; Sqd per lo più debolmente e ottusamente appuntite o leggermente carenate (fig. 47); nella coda, se integra, la lunghezza delle anellature è all'incirca uguale (fig. 47). Parti superiori di regola a fondo verde, bruno, bruno-giallastro o giallo-verdastro; le parti inferiori, almeno in corrispondenza della gola, sono macchiate di nero; le strie sopracciliari (fig. 8), chiare e talora frammentate in macchiette, sono in genere sempre presenti e ben marcate sia nei ♂♂ che nelle ♀♀. È stata, tuttavia, descritta una popolazione insulare delle isole Cerbicale (Corsica) i cui es. hanno, talora, le parti superiori più o meno melanotiche con strie sopracciliari chiare che possono a prima vista confondersi con altre macchiette irregolari dello stesso colore.

NOTE TASSONOMICHE – Oggi vari studiosi la dividono nelle seguenti ssp.: *tiliguerta* della Sardegna (anche a Caprera, Asinara, la Maddalena, S. Pietro, S. Antioco, Serpentara, Tavolara, Molarà) e della Corsica (pure in alcune isole minori adiacenti); *toro* (Mertens) dell'isolotto di Toro (a sud di S. Antioco); *ranzii* (Lanza) dell'isolotto Molarotto presso l'isola Molarà; *maresi* (Lanza) degli isolotti del Toro Piccolo e del Toro Grande (isole Cerbicale, Corsica); *grandisonae* (Lanza) dell'isolotto della Vacca (isole Cerbicale, Corsica); *eiselti* (Lanza) delle isole di Pietricaggiosa, Maestro Maria e Piana (isole Cerbicale, Corsica); *pardii* (Lanza e Brizzi)

dell'isola Giraglia presso Capo Corso; *granchii* (Lanza e Brizzi) degli isolotti Poraggia Piccola e Poraggia Grande (Corsica sud-orient.).

HABITAT – Rocce, muriccioli, rovine, radure e margine di boschi, località arbustive e/o alberate di pianura, collina e montagna sino a oltre 1800 m (Corsica).

MODO DI VITA – (Secondo S. Bruno, B. Schneider e altri). Simile a quello della Lucertola muraiola. Rapida e agile, diurna. Coabita, talvolta, con la Lucertola campestre, che in Sardegna è molto più comune della *P. tiliguerta* alle basse quote, e, più di rado, con la Lucertola di Bedriaga. La latenza invernale inizia in autunno avanzato e termina alla fine di febbraio o di marzo. L'accoppiamento ha luogo in aprile e, talvolta, a maggio. Il ♂ è territoriale. Le uova, da 6 a 12, hanno un guscio biancastro, sono ovali e lunghe 10-16 mm. L'incubazione, affidata al tepore ambientale, dura 2-3 mesi. I piccoli, appena nati, misurano 5-6 cm e 11-14 cm dopo 1 anno di vita.

RAPPORTI CON L'UOMO – Rimando a quanto scritto per la Lucertola muraiola. In Sardegna è chiamata « Caliscèrtula, Zilighèlta, Zirichèlta, Sargantàna, Tilighèlta, Tiliguèrta, Caluxèrtula, ecc. »; con i nomi « Zirichèlta o Tilighèlta pintada » si intendono gli es. a dorso verde macchiati di scuro. In volgare è nota anche come Lucertola tiliguerta.

LUCERTOLA SICILIANA

Podarcis wagleriana

(Gistel, 1868)

(Figg. 52, 53, 54)

I: Sicily Lizard - T: Sizilianische Mauereidechse.

CARATTERI DISTINTIVI – Sqd leggermente carenate (fig. 47); nella




FIG. 54 – 3) *Lucertola siciliana* (*Podarcis wagleriana*): Primosole (Sicilia);
4) *Lucertola tirrenica* (*Podarcis tiliguerta*): Punta Falcone (Sardegna).




FIG. 55 - 5) *Lucertola tirrenica* (*Podarcis tiliguerta*): Punta Falcone (Sardegna); 6) Pori femorali nei Lacertidi.




FIG. 59 – Distribuzione di: 1) *Lucertola urrenica* (*Podarcis tiliguerta*);
 2) *Lucertola muraiola* (*Podarcis muralis*); 3) *Algiroide tirrenico* (*Algyroides fitzingeri*); 4) *Algiroide magnifico* (*Algyroides nigropunctatus*).