


# Lucertola muraiola

*Podarcis muralis* (Laurenti, 1768)



## Tassonomia e descrizione

Lunghezza totale 13-18 (23) cm. Le parti superiori sono verdastre nei maschi e brunnastre nelle femmine e negli esemplari immaturi, da macchiettate a fittamente reticolate in nerastro. Parti ventrali biancastre macchiettate di nero almeno sulla gola. La coda è brunastra o verdastra con anellature scure e sui fianchi sono spesso presenti ocelli azzurri.

Maschi più grandi e con corporatura più robusta e massiccia e pori femorali più sviluppati delle femmine.

## Distribuzione generale

Ampliamente distribuita in Italia settentrionale e centrale, diviene più localizzata nelle regioni meridionali, ove appare relegata ai settori montani.

## Distribuzione e Habitat in provincia

È senza dubbio il rettile più comune e diffuso della provincia, essendo presente sulla quasi totalità del territorio indagato (87,5 % dei quadranti).

Colonizza una grande varietà di ambienti, da quelli aperti ed assolati con vegetazione

scarsa a zone più ombrose ed umide, anche boschive, in tutte le fasce altitudinali.

### **Note di biologia**

La specie è attiva da marzo a novembre, ma si può osservare anche d'inverno, nelle giornate soleggiate.

Le femmine depongono in genere da cinque a sei uova. Può riprodursi fino a tre volte l'anno.

### **Stato di conservazione e normative di tutela**

La specie è inserita nell'Allegato II della Convenzione di Berna, nell'Allegato IV (D) della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "Habitat") ed è protetta dalla Legge Regionale 15/2006 «Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna». Non appare attualmente minacciata nel territorio indagato.