

ЗАПИСКИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ.

MÉMOIRES

DE L'ACADEMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES DE ST.-PETERSBOURG.

VIII^e SÉRIE.

по ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОТДѢЛЕНИЮ.

Томъ XVII. № 1.

CLASSE PHYSICO-MATHÉMATIQUE.

Volume XVII. № 1.

ПРЕСМЫКАЮЩІЯСЯ И ЗЕМНОВОДНЫЯ РОССІЙСКОЙ ИМПЕРИИ.

А. М. Никольскій.

(Herpetologia rossica)

A. Nikolsky.

Съ двумя таблицами.

(Доложено въ засѣданіи Физико-математического отдѣленія 8-го мая 1902 г.).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1905. ST.-PETERSBOURG.

Продается у комиссаровъ Императорской
Академии Наукъ:

Н. И. Глазунова, М. Эггерса и Коаги, и К. Л. Риккера
въ С.-Петербургѣ,
Н. П. Карбасникова въ С.-Петерб., Москвѣ, Варшавѣ
и Вильнѣ,
Н. Я. Отлоблина въ С.-Петербургѣ и Киевѣ,
М. В. Клюкина въ Москвѣ,
Е. И. Распопова въ Одессѣ,
Н. Киммеля въ Ригѣ,
Фоссъ (Г. В. Зоргенфрей) въ Лейпцигѣ,
Люзакъ и Коаги, въ Лондонѣ.

Commissionnaires de l'Académie IMPÉRIALE des
Sciences:

J. Glasounof, M. Eggers & Cie, et C. Ricker à St.-Peters-
bourg,
N. Karbasnikoff à St.-Pétersbourg, Moscou, Varsovie et
Vilna,
N. Oglobline à St. Pétersbourg et Kief,
M. Klikine à Moscou,
E. Raspopoff à Odessa,
N. Kummel à Riga,
Voss' Sortiment (G. W. Sorgenfrey) à Leipsic,
Luzac & Cie. à Londres.

Цѣна: 7 р. — Prix: 14 Mark.

что чешуйки спины у него имѣютъ сильнѣе развитыя ребрышки; у названной разновидности чешуйки гладкія или со слабыми ребрышками, а у *Phr. kuschakewitschi* съ сильно развитыми ребрышками.

Eremias nikolskii Bedr.

Bedriaga. Ann. Mus. Zool. Acad. Petersb. 1905.

Туловище довольно тонкое, голова довольно низкая (φ), морда длинная, остро закругленная, шея очень длинная; ноги средней длины, тощія; заднія ноги далеко не хватаютъ подмышки; кисть задней ноги равна разстоянію шейной складки отъ передняго угла глаза, длина хвоста неизвѣстна, затылочного щитка нѣть; длина темянныхъ превосходитъ ихъ ширину, межтемянной щитокъ узкій, длина лоботемянныхъ щитковъ превосходитъ ихъ ширину, между двумя задними надглазничными щитками нѣть ряда чешуй, два большихъ надглазничныхъ; пространство передъ ними покрыто однимъ крупнымъ щиткомъ и двумя маленькими чешуйками; пространство сзади большихъ надглазничныхъ занято однимъ большимъ щиткомъ; длина лобнаго щитка равна поперечнику обоихъ лоботемянныхъ щитковъ, лобный и лоботемянные щитки непосредственно касаются надглазничныхъ; часть лобнаго щитка, примыкающая къ пространству впереди большихъ надглазничныхъ, по сравненію со швомъ между надглазничными и лобнымъ щитками чрезвычайно мала; длина пространства впереди надглазничныхъ щитковъ равна почти половинѣ первого надглазничного и меньше длины свободнаго края межтемянного щитка, длина шва между лобнымъ и лобносовымъ щитками почти равна длине свободнаго края межчелюстнаго щитка; придаточнаго лобносового щитка нѣть, нѣть также межлобносового; межносовой щитокъ не раздѣленъ, длина его почти на одну четверть превосходитъ длину свободнаго края межчелюстнаго щитка; межчелюстный и межносовой щитки отдѣлены другъ отъ друга двумя соприкасающимися между собой верхненосовыми щитками; верхненосовой, I-й верхнегубной, межчелюстный и межносовой щитки сходятся вмѣстѣ въ одной точкѣ; межчелюстный щитокъ очень широкій, наибольшая ширина его нѣсколько превосходитъ разстояніе середины свободнаго края этого щитка отъ передняго края ноздри и меньше промежутка между переднимъ верхнерѣсничнымъ и задненосовымъ щитками, длина свободнаго края межчелюстнаго щитка приблизительно вдвое болѣе его вертикального края; носовые щитки едва выпуклы и не вздуты, ноздри прорѣзаны вполнѣ сбоку, нижненосовой щитокъ касается двухъ или трехъ переднихъ верхнегубныхъ щитковъ; верхній край второго верхнегубного далеко не достигаетъ вертикали передняго края ноздри; подглазничный щитокъ доходитъ до края рта; передъ подглазничнымъ 5 или 6 верхнегубныхъ; три нижнечелюстныхъ щитка по паро соприкасаются другъ съ другомъ; зубчиковъ на краѣ слухового отверстія нѣть; отъ заднихъ нижнечелюстныхъ щитковъ до середины воротника по средней линіи горла 23 горловыхъ чешуйки; воротникъ состоитъ изъ 10 чешуекъ, брюшные щитки расположены косыми сходящимися подъ угломъ продольными рядами, самый длинный поперечный рядъ состоять изъ 14 щитковъ, самый длинный продольный изъ 31 щитка; верхняя сторона туловища

покрыта кругловатыми и выпуклыми чешуйками; на серединѣ туловища эти чешуйки расположены въ 63 продольныхъ ряда; бедрныхъ поръ 17, промежутокъ между передними порами въ длину одного ряда этихъ поръ помѣщается 4 раза; пространство впереди задняго прохода покрыто щитками приблизительно одинаковой величины; щитки, лежащіе на переднемъ краѣ голени, велики; они приблизительно въ три раза превосходятъ по величинѣ сосѣдніе; верхняя сторона животнаго бурая съ 9 продольными рядами темно-бурыхъ пятенъ, крышка головы въ немногочисленныхъ пятнахъ, брюхо и горло желтоватыя. Водится въ южной части Алайскаго хребта (Тенгү-баръ).

Размеры.	№ 8192. ♀
Всѧ длина	144 мм.
Длина головы	$13\frac{2}{3}$ "
Наиболѣшя ширина головы	$8\frac{2}{3}$ "
Наиболѣшя высота головы	7 "
Длина туловища приблизительно	51 "
Переднія ноги	21 "
Заднія ноги	32 "
Длина кисти задней ноги	15 "
Длина ряда бедрныхъ поръ	$10\frac{1}{2}$ "
Промежутокъ между передними бедрными порами	$2\frac{2}{3}$ "

Сравнительные замѣчанія. Этотъ видъ приближается къ *Eremias multiocellata* Gnthr, но отличается шириной промежутка между передними бедрными порами; у *E. nikolskii* этотъ промежутокъ узкій, у *E. multiocellata* — очень широкій. Безъ труда его можно отличить также отъ *E. velox*; именно у него отличается очень большой шириной щитокъ межчелюстный; длина свободнаго края этого щитка больше длины пространства впереди большихъ надглазничныхъ щитковъ, ширина этой площадки равна почти только половинѣ ширины первого надглазничного щитка; носовые щитки не вздуты; межчелюстный, нижненосовой, верхненосовой и первый верхнегубной сходятся въ одной точкѣ; наконецъ рисунокъ у *E. nikolskii* совсѣмъ другой, нежели у *E. velox*.

Eremias regeli Bedr.

Bedriaga. Ann. Mus. Zool. Acad. Petersb. 1905.

Тѣло скорѣе неуклюжее, голова длинная и пирамидальная, морда длинная съ широко закругленнымъ концомъ, ноги длинныя и сильныя; заднія только немного заходятъ за плечо, кисть задней ноги короче разстоянія отъ воротника до шва между скапулевымъ и скапулоглазнымъ щитками; хвостъ въ длину достигаетъ не менѣе чѣмъ $\frac{2}{3}$ всей длины животнаго, затылочнаго щитка итъ; длина темянныхъ едва больше ихъ ширины; между вторымъ и