

1070

AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta.

Chamaeleo bonae spei. *Laur. amph. p. 46. n. 64.*  
*Seb. mus. I. t. 83. f. 5.*  
*Habitat ad caput bonae spei.*

\*\*\*\*\* Ameivae s. Sepes, collari dupli, scutis abdominalibus quadratis.

Ameiva. 34. L. cauda verticillata longa, scutis abdominis triginta, collari subtus ruga dupli.

Lacerta cauda tereti corpore duplo longiore, pedibus pentadactylis, crista nulla, scutis abdominalis 30. *Amoen. ac. I. p. 127. 293. Mus. Ad. Fr. I. p. 45.*

Lacerta cauda tereti corpore triplo longiore, squamis laevissimis, abdominalibus oblongo-quadratis. *Gronov. mus. 2. p. 80. t. 56.*

Lacertus indicus. *Clus. exot. 115. Raj. quadr. 270.*

*Edw. av. t. 202. 203. Lacertus major viridis.*

*Sloan. jam. 2. p. 333. t. 273. f. 3. Lacertus major cinereus maculatus.*

*Worm. mus. 313. f. 313.*

*Seb. mus. I. t. 85. f. 2. 3.*

86. f. 4. 5.

96. f. 2. 3.

2. t. 63. f. 4.

103. f. 4.

5) Seps surinamensis. *Laur. amph. p. 59. n. 98.*

*Seb. mus. I. t. 88. f. I. 2.*

*Habitat in America.*

*Caput lacertae agilis; scuta abdominalis in 8 ordines digesta.*

Tiliguera. 62. L. cauda verticillata corpore duplo longiore, scutis abdominalis 80. *Cetti anfib. di Sard. p. 15.*

*Habitat per omnem annum in Sardiniae cespitosis, muris, campis, innocens, 7½ pollices longa.*

*Cauda 5 pollices longa; femora posteriora subtus linea punctorum callosorum exarata; mas viridis, maculis nigris; femina fusca.*

agilis. 15. L. cauda verticillata longiuscula squamis acutis, collari subtus squamis constructo. *Fn. suec. 284.*

*Lacerta cauda tereti verticillata longitudine corporis, pedibus pentadactylis unguiculatis. Fn. suec. I. n. 1352.*

*Lacerta cauda tereti longa verticillata squamis acutis, pedibus pentadactylis unguiculatis. Syst. nat. X. I. 36. n. 6.*

*Mus. Ad. Fr. I. p. 43.*

Lacerta